

Pleurothallis minimiflora Schltr., nov. spec.

Epiphytica, repens, perpusilla, florifera usque ad 1,2 cm alta; rhizomate flexuoso, elongato, radicante; radicibus filiformibus flexuosis glabris; caulibus perbrevibus, c. 1 mm altis, vaginis 2 pallidis omnino obtectis; folio oblanceolato-vel obovato-spathulato, obtuso, basi sensim petioliformi-angustato, 4—5 mm longo; inflorescentiis erectis, laxe 2—4-floris, usque ad 1,2 cm altis, pedunculo setiformi; bracteis ovatis, acuminatis, ovarii pedicello paulo brevioribus; floribus tenuibus, in genere inter minimos, glabris; sepalis ovalibus, breviter acuminatis, uninerviis, 0,75 mm longis, lateralibus obliquis; petalis quam sepala paulo brevioribus, oblique lanceolatis, obtusiusculis, uninerviis; labello petalis paululo longiore e basi ovata valde acuminato, basi ipsa rotundato, uninervio; columna brevi, petalis fere duplo brevior, apicem versus paululo dilatata, pede perbrevis; ovario cum pedicello duplo longiore c. 1 mm longo.

Costa Rica: Bei La Palma — C. Wercklé no. 110 (*Orchidaceae Amparoanae*), im Jahre 1922.

Neben *P. jungermannioides* Schltr. ist die Spezies wohl die kleinstblütige. Sie gehört nach Lindleyscher Auffassung zu den „*Apodae-Prorrepentes*“ und müßte daselbst etwa zu Anfang eingereiht werden. Wirklich nähere Verwandte von ihr wüßte ich zurzeit nicht anzugeben. Die Blüten sind überaus zart und so klein, daß es nur unter größten Schwierigkeiten gelingt, eine Diagnose anzufertigen. Über die Blütenfärbung ist leider bisher nichts bekannt.