


Platystele orchestris P. Ortiz, sp. nov.

Pantae perparvae, caepitosae, epiphyticae, caulibus secundariis brevissimis vaginatis, unifoliatis, foliis parvis coriaceis, ellipticis, obtusiusculis, minute triapiculatis, basi cuneatis, petioatis, racemo abbreviato paucifloro, quam folium longiore vel brevior, floribus pro planta grandiusculis, roseo a bidis labello rubro, successivis, uno simul aperto, pedunculo filiformi, sepalis oblonge ovatis acuminatis, apicibus attenuatis, lateralibus superpositis, marginibus minute ciliolatis, petalis falcato-triangularibus, marginibus minute ciliolatis, labello oblonge ovato, apice acuto, microscopice papilloso, columna brevi, antice expansa.

Plantas muy pequeñas, cespitosas, epífitas. Tallos secundarios muy breves, de aproximadamente 12 mm., cubiertos por 2 vainas, unifoliados. Hoja coriácea, elíptica, un poco obtusa, con ápice diminutamente triapiculado, con la base cuneada, con pecíolo acanalado, de aprox. 8 mm. de longitud y 2.5 mm. de anchura máxima. Inflorescencia en racimo abreviado, paucifloro, más corta o más larga que la hoja, con flores relativamente grandes para el tamaño de la planta, sucesivas, una abierta a la vez, de color rosado-banquecino, labelo rojo, pedúnculo filiforme, que nace de un nudo en el tallo secundario, de aprox. 5 mm. de longitud, con 2 vainas agudas, distantes, brácteas florales agudas, pedicelo de aprox. 3 mm. de longitud, ovario de 1 mm. de longitud. Sépalos oblongo-ovados, acuminados, con ápices alargados, con bordes diminutamente ciliolados, de 5 mm. de longitud y 1 mm. de anchura máxima, los sépalos laterales en la base brevemente connatos, con los ápices cruzados; pétalos falcado-trianguulares, con bordes diminutamente ciliolados de 2 mm. de longitud y aprox. 0.5 mm. de anchura en la base; labelo oblongo-ovado, con ápice agudo, microscópicamente papilloso, trinerviado, con nervios laterales más cortos, de 1.5 mm. de longitud y 0.4 mm. de anchura máxima. Columna corta, ensanchada apicalmente, con estigma frontal; polinios 2.



Platystele orchestris P. Ortiz

ETIMOLOGIA: Del griego **orchestris**: "bailarina", por la forma curiosa de la flor, con sus sépalos alargados, los laterales cruzados.

TIPO: **COLOMBIA;** CHOCO, Bahía Solano, enero 1976, **G. Misas 10** (HOLOTIPO: **COL**).

DISTRIBUCION: Colombia, Costa del Pacífico.

Esta curiosa especie se caracteriza por sus flores pequeñas, pero relativamente grandes para el tamaño diminuto de la planta, por sus sépalos y pétalos acuminados, alargados, ciliolados; los sépalos laterales cruzan sus ápices inferiormente, dando una forma muy característica a la flor, que se diría semeja una bailarina de ballet.