

P. chiriquensis Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, 30—35 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulis erectis, teretibus, vaginis c. 3 alte amplectentibus pallidibrunneis magna pro parte obtectis, 15—17 cm longis, supra basin c. 3,5—4 mm diametentibus; folio erecto, oblongo, obtuso, basi in petiolum manifestum c. 2 cm longum contracto. lamina c. 12 cm longa, medio 3,5 cm lata, coriacea; inflorescentiis singulis e spatha parvula, 1—1,3 cm longa, compressa, pedunculo paucivaginulato, c. 4 cm longo, racemo laxe pluri-(c. 15—20-)floro, ut videtur secundo, folium subaequante; bracteis oblongo-cucullatis, apiculatis, pedicello ovarii fere acquilongis; floribus subnutantibus, tenuibus, glabris, albidis; sepalo intermedio ovato, obtusiusculo, trinervio, c. 5 mm longo, lateralibus obliquis, in laminam perlate ovalem, apice bidentatam, 5 mm longam connatis, intermedio aequilongis; petalis subfalcato-oblongis, obtusis, apicem versus paulo dilatatis, 3 mm longis; labello e ungue brevi dilatato, bilamellato, dimidio anteriore in laminam suborbiculari, obtusissimam sursum dilatato, petalis fere aequilongo, in tertia parte apicali c. 1,5 mm lato; columna brevi, petalis paulo breviore, clinandrio lacerato, pede brevi; ovario cum pedicello aequilongo, glabro, c. 5 mm longo.

Panama: Chiriqui, 4000—5000 Fuß ü. M. -- no. 227, blühend im Februar.

Allem Anschein nach wird die Art am besten in die Nähe von *P. velatipes* Ldl. und *P. velaticaulis* Ldl. untergebracht, von denen sie durch kräftigeren Wuchs und die Form der Lippe ausgezeichnet ist.

Die Blütenfärbung wird als „weiß“ angegeben.