

II. TUBULIFLORÆ.

19. **S. deregularis** BARB. ROD. *l. cit. tab. 640.*

S. caule secundario brevi, uniarticulato, cylindraco, folio duplo minore; folio ligulato-oblongo, basi attenuato, apice tridentato, canaliculato; scapo folio majore, recto; floribus secundis; sepalis basi connatis illic cupuliformis deinde liberis, semi-recurvis, oblongis, sub-acutis; petalis multo minoribus, sub-panduratis, acutis; labello carnosolato-trilobato, lobulis lateralibus erectis, sinuatis, lobo medio minimo, linguiformi, callo in basi carnosotransverso. Gynostemio petalis longitudine, clinandri margine dorso unidentata et lateraliter tri-sinuata.

HAB. *sur les arbres des lieux sombres, dans les forêts des montagnes de Rodeio, croissant par touffes. Floraison en Mars.*

Cette espèce s'éloigne de toutes celles que je connais en ce que les lacinies extérieures sont monosépales, trifides, cachant dans la partie cupulée les petits pétales, le labelle et le gynostème. Les boutons sont cylindracés, allongés et non triangulaires, aplatis comme ceux des autres espèces que j'ai vus. Tout le périanthe est blanc-jaunâtre excepté le labelle qui est jaune. Celui-ci est membranacé et non charnu.

