

✓296. **Pleurothallis dolichopus** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, 20—30 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, elongatis, flexuosis, glabris; caulibus gracilibus, teretibus, vulgo vaginis 2 altis, arctissime amplectentibus obsessis, folium vulgo longitudine bene superantibus, 10—15 cm longis; folio erecto, oblongo, obtuso, apice minute exciso cum apiculo, basi in petiolum c. 1,5 cm longum sulcatum attenuato, glabro, coriaceo, lamina 7—9 cm longa, medio fere 1,8—2,8 cm lata; spatha parvula, acuta, glabra, c. 1 cm longa; racemis erectis, singulis vel 2—3-nis, subdense multifloris, secundis, usque ad 20 cm longis, pedunculo brevi; bracteis cucullatis, apiculatis, pedicello aequilongis vel paulo longioribus, glabris; floribus erecto-patentibus, illis *P. acuminatae* Ldl. similibus; sepalis lanceolatis, caudato-acuminatis, extus glabris, intus margines versus papilloso-puberulis, c. 1,8 cm longis, lateralibus paulo obliquis; petalis oblique ligulatis, obtusis, glabris, supra medium paulo dilatatis, extus nervo medio incrassatis, 3,75 mm longis; labello oblongo, obtuso, antice margine subcrenulato, margine basi et medio incurvo, nervis 3 medianis praesertim apicem versus incrassatis, usque infra apicem decurrentibus, petalis aequilongo; columna gracili, glabra, 2,75 mm alta, clinandrio bene alto, lacerato, pede c. 1,5 mm longo; ovario cylindraceo, glabro, cum pedicello c. 0,6 cm longo.

✓Guatemala: Auf den Gebirgen zwischen Coban und Tactic, c. 2000 m ü. d. M. -- H. v. Türckheim no. II, 2072, blühend im Dezember 1907.

Anfangs glaubte ich *P. acuminata* Ldl. vor mir zu haben, doch ist die vorliegende Pflanze durch kleinere Blüten und die Form der Lippe gut unterschieden.