

252. **Pleurothallis formosa** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, pulchella, 20—35 cm alta; rhizomate brevi, decumbente, vaginis obtecto; radicibus filiformibus, elongatis, flexuosis, glabris; caulibus gracilibus, teretiusculis, vaginis 2 peralte amplectentibus, acuminatis sessilibus, 5—15 cm longis; folio erecto-patente, elliptico-lanceolato, apice minute bidentato cum apiculo, basi petiolato-attenuato, glabro, 8—14 cm longo, medio fere 1.5—2 cm lato; racemis gracillimis, peraxe 2—4-floris vulgo singulis, e spatha brevi parvula, folium (saepe duplo fere) superantibus; bracteis cucullato-amplectentibus, acuminatis, pedicello gracili multo brevioribus; floribus in genere inter majores, erecto-patentibus vel patulis; sepalo intermedio e basi ovato-lanceolata longius acuminato, glabro, c. 2,3 cm longo, lateralibus in laminam ovato-ellipticam, longius acuminatam, glabram, apice bifidam, 2,3 cm longam connatis; petalis subfalcatis, oblique subspathulato-ellipticis, obtusis, apicem versus dense verruculosus, trinerviis, 1 cm longis; labello circuitu sagittato-ligulato, obtusiusculo, c. 1,25 cm longo, auriculis basilaribus oblique quadratis, obtusis, lamina dimidio superiore dense papillosa, e basi lamella hippocrepiformi, bicruri ornata; columna brevi, cum clinandrio triangulo elato c. 0,3 cm alta, pede aequilongo; ovario cum pedicello gracillimo, glabro, c. 2 cm longo.

Guatemala: Epiphytisch im Hochwalde bei Coban, c. 1600 m ü. d. M. — H. v. Türckheim no. II, 1995, blühend im Oktober 1907.

Die Art dürfte am besten in die Nähe von *P. scapha* Rehb. f. untergebracht werden, mit der sie auch habituell gut übereinstimmt. Durch die Form der Blütenteile ist sie aber sehr gut geschieden. Die Blüten werden als „bräunlich“ bezeichnet.