

Cryptophoranthus Rodr.

Cryptophoranthus pectinatus Schltr., nov. spec.

Epiphyticus in truncis et ramis arborum repens, cortici valde appressus, usque supra 20 cm longus; rhizomate leviter flexuoso, vaginis pallidis amplectentibus primum omnino obtecto, 4 mm diametiente; caulibus valde abbreviatis, c. 1 cm inter se distantibus, c. 3 mm longis, vix 1,5 mm diametro, vaginis 2 pallidis, apiculatis obtectis; folio obovato, obtuso, basi cuneato, carnosio, 1,5—2 cm longo, supra medium 1—1,3 cm lato; inflorescentiis singulis, unifloris, valde abbreviatis, pedunculo basi paucivaginulato, vix 2 mm excedente; bractea ovali-cucullata, ovarii pedicellum aequante vel paululo superante; flore in genere inter minores, extus piloso, intus glabro; sepalis oblongis, supra medium paulo dilatatis, 3-nerviis, 4-ta parte basilari connatis, 5 mm longis, intermedio obtusiuscule, laterali-bus obliquis, apiculatis, 5-ta parte apicali cum intermedio cohaerentibus; petalis e basi ligulata obovato-spathulatis, obtusis, uninerviis, 2,75 mm longis; labello ex ungue brevi basi minute biauriculato in laminam panduratum margine pectinato-laceratam basi bicostatam expanso, 3 mm longo; columna semitereti, apice late trilobata, 2 mm alta, pede brevi; ovario cylindraco, glabro, pedicello paulo longiore incluso c. 3 mm longa.

Costa Rica: Umgebung von San Ramon — G. Acosta, im Jahre 1921.

Vor allen anderen Arten der Gattung zeichnet sich die vorliegende aus durch das am Rande der Lippenplatte kammartig zerschlitzte Labellum. Auf der Lippenplatte selbst finden sich vor der Spitze auch noch zerstreute kurze Weichstacheln. Im Habitus erinnert die Pflanze an die kriechenden brasilianischen Arten. Wie bei diesen sind die Blüten auch hier sehr versteckt und meist von den Blättern überdeckt. Ich vermute, daß sie immer durch Ameisen befruchtet werden.