

648. **Prescottia panamensis** Schitr., spec. nov.

Terrestris, erecta, pusilla, habitu *P. oligantha* Ldl., in mentem revocans, 6—12 cm alta; radicibus fasciculatis, carnosis, oblongoideo-cylindraceis, pilosulis; foliis basilaribus paucis, c. 3, erecto-patentibus, subsessilibus, ellipticis, obtusiusculis, basi cuneatis, usque ad 1,7 cm longis, medio fere ad 8 cm latis, sub anthesi vulgo jam subemarcidis; seapo gracili, stricto vel plus minusve flexuoso, tereti, glabro, pedunculo vaginis 4—6 arcte amplectentibus, acuminatis, decrescentibus obsesso, usque ad 2 mm supra basin diametiente, racemo dense pluri-vel multi-floro, usque ad 4 cm longo, 3 mm diametiente; bracteis oyalibus, acuminatis, erecto-patentibus, quam flores vulgo brevioribus; floribus erecto-patentibus, inversis, in genere minutis; sepalis ovato-oblongis, obtusis, uninerviis, glabris, vix 1,25 mm longitudine attingentibus, lateralibus obliquis, intermedio (antico) paulo latioribus; petalis oblique oblongo-ligulatis, obtusis, uninerviis, glabris, quam sepala fere aequilongis; labello cucullato quam sepala subaequilongo, facie latiovato, obtuso, subsessili, juxta basin margine utrinque auriculo minuto triangulari obtuso vix incrassato aucto, intus dense retrorsim papilloso; columna pro genere mediocri, rostello obtusissimo, exciso; ovario sessili, cylindraceo-oblongoides, glabro, c. 1,5 mm longo.

Panama: In savannas, Cerro Vaca, Chiriqui, 900—1100 m — H. Pittier no. 5358, Dez. 1911.

Von der verwandten *P. oligantha* Ldl. unterscheidet sich die Art durch das Labellum recht gut.