

2. QUEKETTIA MICROMERA Cogn. pseudobulbis minutissimis, ovoideo-subglobosis, teretiusculis, apice leviter rugosis, basi bifoliatis; foliis brevibus, carnosulis, anguste linearibus, teretiusculis, supra tenuiter sulcatis, apice acutissimis; pedunculo communi ascendent, capillari, simplici, foliis satis breviore, inferne nudo, apice 1—2-floro; bracteis ovatis, acutis, ovario aequilongis; floribus minutis, subsessilibus, segmentis membranaceis; sepalis usque ad basin liberis, linearilanceolatis, breviter acuminatis, dorso rotundatis, lateralibus paulo longioribus; petalis oblongo-lanceolatis, breviter acuminatis, sepalo dorsali aequilongis; labello erecto, superne leviter recurvo, sepalis lateralibus aequilongo, membranaceo, oblongo-panduriformi, apice subabrupte acutissimo, disco usque ultra medium latissime crasseque calloso, callo carnoso, basi excavato, apice producto acute bidentato; columna crassa, brevisima, auriculis longiusculis, anguste triangularibus, acutissimis, subrectis, antice porrectis; anthera supra leviter sulcata, antice anguste producta, apice truncata non incrassata.

*Tabula nostra XXXV. Fig. II (habitus cum analysi).*

*Capanemia micromera* Barb. Rodr.! *Gen. et Spec. Orch.*  
*Nov. I.* 138 (1877).

RADICES numerosae, dense fasciculatae, longiusculae, filiformes, satis flexuosa, simplices, albescentes. PSEUDOBULBI dense aggregati, erecti, inferne laeves, intense virides, 3—4 mm. longi, 2 $\frac{1}{2}$ —3 mm. lati. FOLIA erecta vel erecto-patula, rigida, recta vel leviter arcuata, intense viridia, 1 $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$  cm. longa, 1 $\frac{1}{2}$  mm. lata,  $\frac{3}{4}$ —1 mm. crassa. PEDUNCULUS communis plus minusve flexuosus, teretiusculus, viridis, 1—1 $\frac{1}{2}$  cm. longus. PEDICELLI patuli, capillares, cum ovario 1—1 $\frac{1}{2}$  mm. longi. BRACTEAE patulae, pellucidae, valde concavae, dorso carinatae, pallidae, 1—1 $\frac{1}{2}$  mm. longae. FLORES erecti vel patuli, albi, segmentis erecto-patulis, apice interdum leviter incurvis. SEPALA satis concava,  $\frac{2}{3}$  mm. lata, dorsale 2—2 $\frac{1}{4}$  mm. longum, lateralia leviter obliqua, 2 $\frac{1}{2}$  mm. longa. PETALA leviter concava, paulo obliqua, inferne satis attenuata, 2—2 $\frac{1}{4}$  mm. longa,  $\frac{3}{4}$  mm. lata. LABELLUM paulo concavum, 2 $\frac{1}{2}$  mm. longum, superne  $\frac{3}{4}$ —1 mm. latum, callo pallide flavo. COLUMNA lateraliter satis compressa, basi valde constricta, vix  $\frac{1}{2}$  mm. longa.

Var. β. MAJOR Cogn.

PLANTA robustior. PSEUDOBULBI ovoideo-oblongi, 8—12 mm. longi. FOLIA crassiora, usque 5 cm. longa. PEDUNCULUS communis 2—3 cm. longus, 4—6-florus. PEDICELLI cum ovario 1 $\frac{1}{2}$ —2 mm. longi. BRACTEAE 1 $\frac{1}{2}$ —2 mm. longae. FLORES ut in typo.

*Habitat in sylvis humidis supra arbores secus flum. Dourado prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues; in arboribus prope Caldas: Regnell ser. III. n. 1172; prope Caldas in arboribus locis paludosis ad Riburão dos Buggris: Lindberg n. 542; in arboribus prope Campanha: Schreiner ex Schwacke n. 5506. — Var. β. In Brasilia austro-orientali loco accurato haud indicato: Glaziou n 17788. — Floret Junio—Augusto.*