

4. QUEKETTIA THERESIAE Cogn. pseudobulbis parvis, ovoideis, leviter compressis, basi bifoliatis, apice monophyllis; foliis parvis, carnoso-coriaceis, complanatis, lanceolatis, apice acutis, basi satis attenuatis; pedunculo communis erecto, filiformi, simplici, foliis satis breviore, basi vagina unica membranacea longiuscula acutaque vestito, superne laxiuscule 3—4-floro; bracteis ovatis, acutis, basi vaginantibus, ovario paulo longioribus; floribus minutis, brevissime pedicellatis, segmentis membranaceis; sepalis usque ad basin liberis, subaequilongis, lanceolatis, acutissimis, dorso rotundatis, lateralibus vix angustioribus; petalis late lanceolatis, acutis, non carinatis, sepalo dorsali subaequilongis; labello erecto, sepalis lateralibus paulo breviore, carnosulo, ovato-lanceolato, ad medium non constricto, apice acuto, disco inferne usque ad medium latissime crasseque bicalloso, callis carnosis, convexis, laevibus, apice incrassatis late rotundatis; columna crassa, brevissima, auriculis longiusculis, linearibus, obtusiusculis, subincurvis, antice porrectis; anthera postice leviter sulcata, antice dilatata, apice subtruncata non incrassata.

*Tabula nostra XXXV. Fig. IV (habitus cum analysi).*

*Capanemia Therasiae Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. II. 244 (1882).*

RADICES numerosae, dense fasciculatae, breves, filiformes, leviter flexuosa, simplices, albescentes. PSEUDOBULBI erecti vel patuli, dense aggregati, laeves, nitiduli, intense virides, 7—10 mm. longi, 5—7 mm. lati. FOLIA crassa, rigida, plus minusve patula, superne leviter recurva, plus minusve concava, supra nitidula et intense viridia, subtus satis pallidiora, 2—3 $\frac{1}{2}$  cm. longa,  $\frac{1}{2}$ —1 cm. lata; nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente; nervulis lateralibus indistinctis. PEDUNCULUS communis leviter geniculato-flexuosus, teretiusculus, viridis, 1 $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$  cm. longus. PEDICELLI erecto-patuli, capillares, cum ovario 1 $\frac{1}{2}$ —3 mm. longi. BRACTEAE patulae, membranaceae, valde concavae, dorso leviter carinatae, pallidae, 2—3 $\frac{1}{2}$  mm. longae. FLORES erecti, albi. SEPALA erecta, apice leviter incurva, satis concava, uninervulosa, 3 ad 3 $\frac{1}{2}$  mm. longa, dorsale 1 mm. latum, lateralia satis obliqua, basi extus valde constricta,  $\frac{3}{4}$  mm. lata. PETALA erecta, satis concava, vix obliqua, inferne satis attenuata, uninervulosa, 3 mm. longa, 1 $\frac{1}{4}$  mm. lata. LABELLUM satis concavum, 2 $\frac{1}{2}$  mm. longum, 1 $\frac{1}{4}$  mm. latum, callis flavescentibus. COLUMNA teretiuscula, basi valde constricta,  $\frac{1}{2}$  mm. longa.

Var. β. ANGUSTIFOLIA Cogn.

PLANTA paulo minor. FOLIA linearis-ligulata, 2—2 $\frac{1}{2}$  cm. longa, 2—3 mm. lata.

*Habitat in sylvis supra arbores ad Petropolis prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Var. β. In prov. Minas Geraes loco accurato haud indicato: Schwacke n. 11615. — Floret Maio.*