

R. Powellii Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, 11—13 cm alta; rhizomate valde abbreviato; caulis erectis, rigidulis, vaginis c. 6 ancipitibus, acuminatis omnino obtectis, usque ad 7 cm longis, c. 1,5 mm diametentibus; folio erecto, oblongo vel anguste ovato, basi rotundato et in petiolum brevem, usque ad 5 mm longum contracto, petiolo excluso 4,8—6 cm longo, medio vel infra medium 1,8—2,2 cm lato, carnosso-coriaceo; inflorescentiis succedaneis ex axillo folii, abbreviatis, unifloris, pedunculo brevi, basi vaginulato, c. 3 mm longo; bractea oblonga acuta, pedicellum ovarii haud aequante; floribus in genere inter minores, labello excepto glabris; sepalo intermedio e basi anguste lanceolata in apicem subclavato-incrassatam producto, 5-nervio, 1,6 cm longo, lateralibus oblique et anguste oblongis, obtusiusculis, 5-nerviis, 1 cm longis, usque ad medium fere connatis; petalis anguste linearibus apice incrassatis, ima basi margine utrinque paulo dilatatis, 6 mm longis; labello circuitu linguiformi, lobis basilaribus oblique tringulis, apice in setam porrectam productis, basi excepta superne muriculato-papilloso, apice obtuso, ungue perbrevi incluso 4,5 mm longo; columna curvata, apice dilatata, 4 mm longa, pede more generis bilobato, incrassato; ovario cum pedicello longiore gracili, 1,1 cm longo, glabro.

Panama: Chiriqui-Distrikt, auf umgefallenen Bäumen, c. 4000 Fuß ü. M. — no. 123.

Die Art steht der *R. Dayana* Rchb. f. wohl am nächsten, ist aber durch die längeren Stämmchen, die Blütenfärbung und die Form des Labellums unterschieden.

Nach Mr. Po wells Notizen sind die Blüten auf weißlichem oder blaßgelbem Grunde leuchtend purpurrot längsfleckig.