

XX. *Rodriguezia* Rz. Pav.

Perigonium carnosum-membranaceum, subpellucidum. Phylla superiora subaequalia, lateralia interna latiora, infima coalita, vulgo apice bifida, naviculari-excavata, basi saccato-descendentia ab origine. Labellum ima basi cum gynostemio connatum, cum illo parallelum, sessile, inferne in calcar solidum productum, subconnivens, in phylla externa infima incumbens; a basi angustiori antice obcordato-dilatatum; venae centrales cristigerae. Gynostemium teretiusculum, gracile, apice clavatum, utrinque in brachia ascendens carnosum, alaeformia, vulgo antice producta et sub angulis androclinii, et sub fovea stigmatica. Androclinium ellipticum, triangulum, margine postico et utroque angulo angulatum, anguli nunc auriculati producti, nunc abbreviati; fundo excavatum. Rostellum ascendens, triangulum, apice bidentatum. Stigma in fovea inter rostellum et brachia illa absconditum. Anthera oblongo-mitrata, dorso medio vulgo elevatulo, tumido, intus linea transversa dimidiata in partem polliniferam et caudiculigeram, linea cruciata loculorum confinia indigitante. Pollinia 2 globosa, seu oblongo-globosa, basi excisa fissa. Caudicula linearis, basi dilatata. Glandula oblonga, rostelli ventri appressa. — Hier die Aufzählung der hierher gehörigen Arten, über einige noch hierher und zur folgenden Gattung gehörige Formen das nächste Mal, da es heut an Raum gebricht. (Gartenorch. IV.)

- 60. *R. secunda* Hb. B. Kth.
- 61. *R. carnea* Lindl.
- 62. *R. maculata* (*Burlingtonia maculata* Lindl.).
- 63. *R. decora* (*Burlingtonia decora* Lem. *Burlingtonia amoena* Planchon).
- 64. *R. Batemanni* Endl. Pöpp. (*Burlingtonia rubescens* Lindl.).
- 65. *R. fragrans* (*Burlingtonia fragrans* Lindl.).
- 66. *R. rigida* (*Burlingtonia rigida* Lindl.).
- 67. *R. obtusifolia* (*Burlingtonia obtusifolia* Lindl.).
- 68. *R. granadensis* (*Burlingtonia granadensis* Lindl.).
- 69. *R. pubescens* (*Burlingtonia pubescens* Lindl.).
- 70. *R. candida* Bat. (*Burlingtonia candida* Lindl.).
- 71. *R. venusta* (*Burlingtonia venusta* Lindl.).
- 72. *R. pubescens*] (*Burlingtonia pubescens* Lindl.).

*Dubiae.*

*Burlingtonia nivea* Lindl. B. R. sub 1927. (lin. penultim descr. *B. rigidae* — calami lapsu pro *candida*?). —

*Rodriguezia lanceolata* Fl. Peruv. (eadem quae Tab. XXV.? hinc *R. candidae* affinis!).

*Rodriguezia ensiformis* Fl. Peruv.

73. *Gomezia laxiflora* Klotzsch Mss. Rb. fil. (*Rodriguezia laxiflora* Lindl. *Gomezia chrysostoma* Hffg.).

74. *Gomezia recurva* B. Mag. (*Rodriguezia recurva* Lindl.).

75. *Gomezia crispa* Klotzsch Mss. Rb. fil.

76. *Gomezia planifolia* Klotzsch Mss. Rb. fil.

77. *Gomezia foliosa* Klotzsch Mss. Rb. fil. (*Pleurothallis foliosa* Hook. *Rodriguezia suaveolens* Lindl.).

78. *Papperitzia* Rehb. fil. In der Gattungsdiagnose ist nach „canaliculata“ saccata geniculata ausgelassen. Der Lippengrund bildet einen Bauch nach unten, steht schief aufwärts, die Leiste liegt auf die Säule auf. Höchst eigenthümlich!

XXII. *Euothonaea*.

Nov. Gen. Alamanniae floris structura simile labelli insertione ac androclinio tridentato ac vegetatione a *Diothonaea* recedens. cf. Gartenorch. IV.

79. *E. imbricata* (*Diothonaea imbricata* Lindl.).

80. *E. oppositifolia* (*Diothonaea oppositifolia* Rehb. fil.).