

SANTANDERELLA P. Ortiz, gen nov.

Inter genera subtribus Oncidiinarum (sensu R. Dressler) distinguitur sequentibus characteribus: plantae epiphyticae, pseudobulbis unifoliatis, caespitosis, foliis conduplicatis, inflorescentiae racemosae pluriflorae, pendentes, floribus sat parvis, sepalis similibus, lateralibus liberis, petalis angustis, labello angusto, exungiculato, basi dilatato, deinde angustato et in medio apicali parum dilatato, apice acuto. Columna recta, basi terete, bialata, alis obtusis, anthera dorsali, sat magna, rostello carnoso in medio clinandrii prolongato in apicem acutum, polliniis elongatis, laminaribus, canaliculatis, affixis stipiti longo, viscidio rotundato, stigmatе strictissimo, longitudinali.

2 Véase Dressler 1981: 63-66.

Tipo: *Santanderella amado-rinconiana* P. Ortiz, in hoc loco.

Descripción: la descripción más amplia se hace al describir la única especie conocida hasta ahora.

Etimología: El nombre genérico se deriva del nombre del Departamento de Santander (Colombia), donde se ha encontrado la especie tipo³.

Distribución: Hasta ahora sólo se conoce del Departamento de Santander (Colombia).