

*C. latifolium* Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, adscendens vel patulum, usque supra 50 cm longum, simplex vel parum ramosum; rhizomate elongato, vaginis mox desiccantibus omnino obtecto, c. 5 mm diametro: pseudobulbis late ovalibus, unifoliatis, 4—5 cm inter se distantibus. 3.4—4 cm altis, medio fere 1.5—2 cm latis; folio lanceolato-ligulato, subacuto, basi subpetiolato, angustato, usque ad 20 cm longo, infra medium ad 4 cm lato; inflorescentiis ad basin pseudobulborum singulis vel paucis, abbreviatis, unifloris, pedunculo c. 1.5 cm longo, vaginis paucis laxè obsessis; bractea ovarium amplectente et aequante vel paulo superante; floribus in genere satis magnis, glaberrimis, niveis, in basi labelli macula aurea ornatis, textura tenuibus; sepalis anguste oblongis, obtusiusculis, 2.5 cm longis, lateralibus obliquis; petalis oblique ligulatis, subacutis, medio leviter dilatatis, c. 2.4 cm longis; labello brevi, e tertia parte apicali trilobo, callo depresso ligulato obtuso, minute pilosulo, e basi usque in medium decurrente ornato, 1.5 cm longo, inter apices loborum lateralium (explanato) 1.7 cm lato, e basi semiorbiculari in lobos laterales patentes acuminato-triangulos, obtusiusculos dilatato, deinde sinu obtuso in lobum anticum ovato-triangulum obtusum producto; columna mediocri, semitereti, 1 cm longa; ovario cylindraceo, glabro, 1 cm longo.

Panama: Auf Hügeln bei Panama-City — no. 8.

Ich wüßte nicht, welcher Art der Gattung ich diese interessante Pflanze zur Seite stellen könnte. Sie weicht habituell von allen anderen stark ab und erinnert mehr an gewisse *Ornithidium*-Spezies, in den Blüten ist sie aber ein echtes *Camaridium*.

Die Blüten sind gelb mit einem gelben Fleck im Schlunde der Lippe.