

62. *Scaphosepalum Escobarianum* Garay, sp. nov.

Epiphytica, caespitosa, usque ad 25 cm. alta; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulibus secundariis satis crassiusculis, vaginis, 3-nis, infundibuliformibus imbricantibusque omnio obtectis, usque ad 2.5 cm. altis; folio papvraceo, oblongo-elliptico, acuto, basin longe angusteque petiolato, petiolo 9 cm. longo inclusu usque ad 20 cm. longo, 4 cm. lato; inflorescentiis erectis, quam folia subaequilongis seu superantibus, glabris; pedunculo tereti, distanter 3-4-vaginato; rhachide fraxtiflea cum floribus; succedaneis uniflora, usque ad 10 cm. longa; bracteis distichis ovato-lanceolatis, laterali compressis, usque ad 10 mm. longis; floribus satis carnosis, non resupinatis; sepalo postico valde concavo, ovato-lanceolato, dorso-lateriter carinato, apicem versus teretiusculo, subcaudato, 13 mm. longo; sepalis lateralibus inter se usque ad medium connatis, deinde rectangulariter divaricatis, ibi pulvinatis, apice longe caudatis, usque ad 10 mm. longis, caudis 13 mm. longis; petalis dolabriforibus, acutis, 4 mm. longis, 2 mm. latis; labello arcuato, ex ovato-subquadrata basi pandurato, antice lobo terminali spathulato, margine denticulato donato, disco ad constrictiōnem bicarinato; toto labello 5 mm. longo, 2 mm. lato; ovario cylindrico, 3-alato, 1 mm. longo cum pedicello usque ad 1 cm. longo articulato.

COLOMBIA: Depto. de Antioquia, Frontino. Coll. G. Escobar No. 712! Type (AMES); ibid. No. 57! (AMES).

*Scaphosepalum Escobarianum* se diferencia fácilmente de *S. anchoriferum* (Rchb. f.) Rolfe y de *S. ochthodes* (Rchb. f.) Pfitz. debido al pedúnculo y raquis glabros; difiere de *S. swertiaefolium* (Rchb. f.) Rolfe por tener anchas bracteas disticas y de *S. odontochilum* Krzl. por los sépalos laterales pronunciadamente caudados. (Ver ilustración en color, páginas centrales).

*Scaphosepalum Escobarianum* is easily separable from *S. anchoriferum* (Rchb. f.) Rolfe and *S. ochthodes* (Rchb. f.) Pfitz. on account of the glabrous peduncle and rachis; it differs from *S. swertiaefolium* (Rchb. f.) Rolfe in having large distichous bracts and from *S. odontochilum* Krzl. in having pronounced caudae to the lateral sepals. (See color photo in central pages).



*Scaphosepalum Escobarianum,*  
Garay