

Costaricaea Amparoana Schltr., nov. spec.

Suffrutex epiphyticus, erectus vel subpatulus, ad' 50 cm longus; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; pseudobulbis cylindraceis, apice bifoliatis, basi vaginis 3 arcte amplectentibus, obtusis, rugulosis donatis, infimo 23—27 cm longo, c. 3,5—4 mm diametro, superioribus bene brevioribus sed aequicrassis; foliis lineariligulatis, obtusis, breviter excisis, 6—14 cm longis, medio fere ad 1,2 cm latis; inflorescentiis suberectis generis, floribus inclusis ad 4 cm longis, pedunculo gracili, c. 1—1,3 cm longo; bracteis scariosis, caducis, oblongis, subacutis, ovarium excedentibus; floribus erecto-patentibus, glabris, pallide brunneis; labello albo-luteo striato antice brunneo-marginato et purpureo-striolato; sepali lanceolatis, acutis vel subacuminatis, plurinerviis, 1,3 cm longis, lateralibus obliquis; petalis oblique linearilanceolatis, acutis, 3-nerviis, quam sepala subaequilongis; labello generis, 1,2 cm longo, antice c. 7 mm lato, supra medium latere utrinque margine lobulo laterali parvulo oblique triangulo instructo, per medium praesertim basin versus minutissime papilloso; columna generis, c. 7 mm longa, infra apicem c. 5 mm lata; ovario pedicellato, gracili, glabro, c. 2 cm longo.

Costa Rica: La Palma — C. Wreké no. 126, blühend im Juni 1921.

Die Blüten dieser Art müssen recht ansehnlich sein. Die Pseudobulben oder Stämmchen sind ziemlich starr und die Blätter sehr derb. Auch die Konsistenz der Blüten ist ziemlich fest.