

**Scaphyglottis Ruiz u. Pav.****Scaphyglottis Bradeorum** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta vel adscendens; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulibus multis, fasciculatis, superpositis, gracilibus, teretibus, primum vaginis obsessis, bifoliatis, inferioribus 10—12 cm longis, supra basin subfusiformi-incrassatulis, 3—5 mm diametro, superioribus mox bene minoribus; foliis erecto-patentibus, anguste linearibus, apice obtuse bidentatis, 12—20 cm longis, usque ad 4,5 mm latis; inflorescentiis unifloris, paucis, in apice caulium

F. Fedde, Repertorium specierum novarum. Beiheft XIX.

8

114. **R. Schlechter: Beiträge zur Orchideenkunde von Zentralamerika.**

fasciculatis, abbreviatis, pedunculo brevissime et basi ovarii vaginis c. 3 obtectis; bractea deltoidea, minuta; flore in genere parvulo, illo *S. guatemalensis* Schltr. et *S. dolichophyllae* Schltr. simili, glabro; sepalis oblongis, obtusis, 3-nerviis, c. 4 mm longis, lateralibus obliquis, apiculatis, mentum perbreve formantibus; petalis oblique ligulatis, obtusiusculis, basin versus sensim paululo angustatis, uninerviis, quam sepala paulo brevioribus et bene angustioribus; labello sepala fere aequante, obovato-spathulato, antice subquadrato, apice leviter emarginato, 4 mm longo, supra medium c. 2 mm lato; columna semitereti, ebrachiata, c. 3,3 mm longa, pede perbrevis; ovario sessili, glabro, cylindraco, c. 8 mm longo.

Costa Rica: Ohne Standortsangabe und Nummer — A. u. C. Brade.

Die Art ist mit *S. guatemalensis* Schltr. und *S. dolichophylla* Schltr. verwandt, unterscheidet sich aber durch die Tracht, die sich in der starken Büschelung der Stengel besonders äußert, ferner durch kleinere Blüten, mehr spatelige, einnervige Petalen und die breitere Lippenform.