

Scaphyglottis cuneata Schltr. n. sp.

Epiphytica, erecta, c. 13 cm longa; rhizomate valde ab breviato; pseudobulbis anguste cylindraceis, superporitis, bifoliatis, inferioribus c. 10 cm longis, ad 4 mm diametentibus, superioribus multo minoribus; foliis erecto-patentibus, ligulato-linearibus, inaequaliter et obtuse bilobulatis, ad 5,5 cm longis, medio fere 8 mm latis; floribus singulis, ad apices pseudobulborum, vaginulis paucis imbricantibus protectis, tenuibus, glaberrimis; sepalis oblongis, acutis vel subacutis, vix 4 mm longis, lateralibus obliquis, basi margine anteriore paulo dilatatis, mentum per breve obtusum formantibus; petalis linearili-gululatis, obtusis, quam sepala subaequilongis, paulo obliquis; labello e basi unguiculata cuneato-flabellato, antice valde obtuso, semiorbiculari, medio fere plicati brevi tenui ornato, toto c. 5 mm longo, infra apicem vix 3 mm latu, columna gracili, semitereti, ebrachiata, c. 2,5 mm longa, pedicelli brevi; anthera cucullata, glabra, antice obtuse apiculata; ovarium pedicello brevi clavato, glabro, c. 4 mm longo.

G u a t e m a l a : Epiphytisch am Ufer des Rio Dulce bei Livingston. — H. v o n T ü r c k h e i m , Febr. 1884.

Eine nicht sehr charakteristisch aussehende Art vom Habitu der *L. Behrii* Rchb. f., aber von kräftigerem Wuchs mit einer ganz anderen Lippenform.