

Fractiunguis Schltr.**Fractiunguis cuniculatus Schltr., nov. spec.**

Epiphyticus, erectus vel subpatulus, usque ad 25 cm longus; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulinis (vel pseudobulbis) superpositis, rigidulis, unifoliatis, e basi attenuata gracili apicem versus levissime incrassatis, basi vaginulatis 3 donatis, inferioribus 6,5—8 cm longis, infra apicem usque ad 2,5 mm diametro, superioribus brevioribus; folio subulato, acuto, usque ad 11 cm longo, c. 2 mm medio diametente; inflorescentiis capitellato-fasciculatis, uni-

32 R. Schlechter: Beiträge zur Orchideenkunde von Zentralamerika.

floris, subsessilibus, vaginis ovalibus imbricantibus circumdatis; bractea parvula hyalina, ovario breviore; floribus illo *F. brasiliensis* Schltr. paulo brevioribus, tenuibus, glabris; sepalis ovato-lanceolatis, acuminatis, glabris, c. 5 mm longis, lateralibus obliquis, basi producta cum ovario cuniculum oblongoideum satis magnum formantibus; petalis oblique linear-lanceolatis, acutis, 3-nerviis, quam sepala paululo brevioribus; labello ex ungue cuneato, brevi, concavo, in laminam circuitu late ovatam antice breviter excisam e medio subpandurato-angustatam, marginibus leviter undulatam, basi cuneata breviter bilamellatum dilatato, ungue inclusu 5 mm longo, lamina 4 mm longa, supra basin 4 mm lata, infra apicem 2,5 mm lata; columna semitereti, glabra, c. 3,75 mm longa; ovario sessili subclavato, c. 9 mm longo, glabro.

Costa Rica: San Jeronimo, auf der pazifischen Seite 1400 m C. Wercklé no. 83, blühend im November 1920; bei Carthago — Oersted no. 47, ohne Blüten.

Die Art ist von den anderen der Gattung durch die längeren Stämmchen der Pseudobulben, kürzere Blätter, die köpfchenartig zusammenstehenden Infloreszenzen und die auffallende Achsenspornbildung gut unterschieden.

Die Blüten sind offenbar weißlich.