

S. Powellii Schltr., nov. spec.

Epiphytica, ut videtur patula, usque ad 40 cm longa; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; pseudobulbis e basi substipitato-attenuata subfusiformibus, bifoliatis, mox longitudinaliter rugosis, novellis superpositis bene brevioris, inferioribus usque ad 13 cm longis, medio fere usque ad 1 cm diametentibus; foliis erecto-patentibus, linearibus, sub lente breviter et obtuso bilobulatis, inferioribus usque ad 13 cm longis, medio usque ad 8 mm latis; inflorescentiis more generis valde abbreviatis, unifloris, paucis fasciculatis, pedunculo subnullo, basi vaginulato; bractea ovata, brevi, ovario multo breviore; flore in genere satis magno, glabro, fide collectoris albo, anthera purpurea et macula purpurea ad basin columnae ornata; sepalis oblongis, 3-nerviis, subapiculatis, 6 mm longis, lateralibus obliquis, basi margine anteriore paulo producta mentum breve obtusum formantibus; petalis oblique oblongo-ligulatis, obtusiusculis, 3-nerviis, basin versus paulo angustatis, quam sepala subaequilongis; labello e basi angustata cuneato, circuitu quadrato ovali, medio abruptius constricto, apicem versus sursum dilatato, apice bene exciso (quasi quadrilobato), marginibus subcrenulato-irregularibus, nervis 3 medianis e basi usque supra medium leviter incrassatis, verruculis sparsis per medium ornato, toto c. 6,5 mm longo, infra medium et infra apicem c. 3,5 mm lato; columna leviter curvata, c. 4 mm longa, infra stigma margine utrinque brachio falcato-porrecto, parvulo acuto ornata; ovario graciliter cylindraceo, glabro, c. 9 mm longo.

Panama: Chiriquí, 3000—4000 Fuß ü. M. — no. 134.

Am besten wird diese Art wohl neben *S. brachiata* Schltr., die ebenfalls in Panama beheimatet ist, untergebracht. Von ihr ist sie unterschieden durch den viel kräftigeren Wuchs, längere Blätter, größere Blüten und die Form der Lippe.

Die Blüten unserer neuen Art sind weiß mit purpurner Anthere und purpurnem Fleckchen am Grunde der Säule.