

104. *Scaphyglottis subulata* Schltr., nov. spec.

Epiphytica, humilis, c. 15 cm alta, pluricaulis; caulis (pseudobulbis) erectis, superpositis cylindraceis, basin versus paulo attenuatis, apice unifoliatis, basi vaginulis paucis obtectis, 3—4,5 cm longis, supra medium 1,5—2 mm diametentibus; folio erecto linearis-subulato acuto, rigido, c. 4,5 cm longo, c. 1,5 mm lato, glabro; floribus ad apices pseudobulborum singulis vel paucis fasciculatis, in genere mediocribus; sepalo intermedio oblongo-ligulato breviter acuminata, glabro, 3,5 mm longo, lateralibus subfalcato-lanceolatis acutis, intermedio sublongioribus, glabris, basi margine anteriore paululo dilatatis; petalis oblique lanceolato-ligulatis acutis, glabris, sepalo intermedio aequilongis; labello e basi linearis-unguiculata trilobo, glabro, 3,5 mm longo, lobis lateralibus oblongis obtusissimis, intermedio majore quadrato antice truncato, callo pusillo haud bene conspicuo in medio; columna gracili, pede manifeste producto, brachiis falcatis, lanceolatis acutis, brevibus juxta stigma ornata, clinandrio amplo; anthera cordata antice obtusa, glabra, polliniis 4 oblique ovoideis, compressis; ovario breviter pedicellato clavato, glabro.

Costa Rica: Bei Carthago. — A. Biolley no. 1367, blühend im September 1889.

Vor allen anderen Arten ist die vorliegende durch die steifen pfriemlichen Blätter ausgezeichnet. Leider ist das vorliegende Material recht spärlich.