

Scaphyglottis Ruiz et Pav.**Scaphyglottis Wercklei** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta vel ascendens, usque ad 20 cm alta; rhizomate valde abbreviati; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; pseudobulbis superpositis, cylindraceis, bifoliatis, inferioribus usque ad 8 cm longis c. 2—3 mm diametro, superioribus bene minoribus, saepe 1,5 cm tantum longis; foliis patentibus vel subpatentibus, linearibus, obtusis, usque ad 4 cm longis, c. 3 mm latis; inflorescentiis more generis abbreviatis, unifloris, ad apices pseudobulborum fasciculatis, vaginis brevibus paucis imbricantibus basi obtectis; floribus in genere inter minores, glabris, tenuibus; sepalis oblongis obtusis, 3-nerviis, c. 5 mm longis, lateralibus obliquis, basi rotundatis, cum pede columnae mentum obtusum perbreve formantibus; petalis oblique et obtuse linearibus, uninerviis, quam sepala paululo brevioribus; labello e basi subunguiculato-angustata cuneato, antice rotundato et valde obscure trilobulato, obtusissimo, superne nudo, 5 mm longo, infra apicem 2,75 mm lato; columna gracili, semitereti glabra, c. 3,5 mm longa; ovario pedicellato clavato, glabro, c. 3,5 mm longo.

Costa Rica: San Jeronimo, c. 13500 — C. Wercklé no. 105; no. 107, im Jahre 1922.

Die Art steht der **S. gracilis** Schltr. (*Tetragamestus gracilis* Schltr.) am nächsten und ist mit ihr zusammen dadurch ausgezeichnet, daß die Säule fast fußlos ist, was mich veranlaßte, *S. gracilis* Schltr. erst als *Tetragamestus* anzusehen. Von *S. gracilis* Schltr. ist unsere Art getrennt durch den kürzeren Wuchs mit kürzeren Blättern und Pseudobulben resp. Stämmchen und das oberseits nackte Labellum ohne die für *S. gracilis* Schltr. charakteristische Querfalte am Grunde der breiteren, mehr rhombischen Lippenplatte.