

Scelochilus aureus Schltr., nov. spec.

Epiphyticus, erectus, usque ad 20 cm altus; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; pseudobulbis cylindraceo-conicis, unifoliatis, usque ad 2 cm altis, supra basin ad 4,5 mm diametro, primum vagina amplectente donatis; folio erecto, oblongo-ligulato, obtusiusculo, basi contracto, usque ad 13 cm longo, medice fere usque ad 3 cm lato; inflorescentia erecta, laxe pauciflora, foliis paulo excedente, pedunculo paucivaginulato, folia fere aequante; bracteis deltoideis, ovario pedicellato multo brevioribus; floribus illis *S. Ottonis* Kl. fere aequimagnis, aureis, glabris, erecto-patentibus; sepalo intermedio oblongo, apiculato, concavo, c. 1,7 cm longo, lateralibus in laminam oblongam breviter bilobam, basi breviter saccatam connatis, 1,9 cm longis; petalis oblique oblongis, obtusis, basin versus paulo angustatis, sepalo intermedio fere aequilongis; labello e basi lineari, basi ima calcaribus 2 brevibus ornato in tertia parte basilari lobulis 2 falcato-lanceolatis acuminatis ornato, deinde in laminam oblongam constricto, in tertia parte apicali lobulis interioribus apiculatis ornato, lobo anteriore obovato, retuso, antico, quam laterales multoties breviores; columna brevi, crassiuscula, c. 5 mm alta; ovario cylindraceo, subpedicellato, c. 2 cm longo.

Costa Rica: Tabbazo, c. 1600 m ü. M. — A. u. C. Brade no. 1063, blühend im August 1909.

Die Art ist am nächsten verwandt mit *S. Ottonis* Kl., unterscheidet sich aber durch das schmalere Labellum von anderer Form und durch höheren Wuchs. Die Blüten sind nach einem beige-fügten Aquarell des Herrn A. Brade goldgelb.