

333. **Spiranthes Wercklei** Schltr., nov. spec.

Herba humilis, erecta, nigrescens, c. 14 cm alta; radicibus fasciculatis, crassiusculis, villosulis; folio radicali erecto-patente, graciliter petiolato, glabro, lamina ovata, breviter acuminata, basi subcordato-rotundata, c. 4 cm longa, infra medium 2,5 cm lata, petiolo sulcato basi vix dilatato, c. 2,3 cm longo; scapo erecto substricto, vaginis pluribus amplectentibus, acuminatis obsesso, tereti, e basi glabrata apicem versus dense et breviter puberulo; spica sublaxe pluri- (c. 5-) flora, c. 2,5 cm longa; bracteis erecto-patentibus, ellipticis, acuminatis, glabris, ovario fere aequilongis; floribus in genere vix inter mediocres, erecto-patentibus; sepalis oblongo-ligulatis, obtusis, extus minute et densius puberulis, vix 0,4 cm longis, lateralibus obliquis, basi paulo decurrentibus; petalis oblique linear-ligulatis, obtusis, sepalo intermedio margine intus dense agglutinatis, paulo brevioribus, glabris; labello e basi brevissime unguiculata quadrato-oblongo, basi apiceque angulis obtusis, apice subtruncato, 3,5 mm longo, medio utrinque rotundato-lobulato, omnino glabro; columna gracili, brevi, facie puberula, dorso glabra, rostello triangulo, satis alto, breviter bifido; anthera ovato-cordata, acuta, superne umbo-nata, glabra; ovario sessili, torto, crassiuscule cylindrico, 3,5 mm longo.

Costa-Rica: Ohne nähere Standortsangabe. — leg. C. Wercklé (com. K. Schumann).

Die Art ist mit keiner der anderen zentral-amerikanischen nahe verwandt. Habituell könnte man sie für eine *Craniches* halten, doch hat sie ganz charakteristische *Spiranthes*-Blüten. Sie trocknet vollständig schwarz.