

Auf der Basis dieser Differentialdiagnostik erfolgt nunmehr – analog zu *Chondrorhyncha* – die Gattungstrennung, wobei zur neu begründeten Gattung *Senghasia* 12 Arten gehören, während *Kefersteinia* s. str. mittlerweile 44 Arten umfasst (vgl. hierzu bei SENGHAS in den SCHLECHTER-Nachträgen Bd. **IC**, S. 2772-2773, wo sämtliche zwischen 1992 und 2002 neu beschriebenen 21 Arten aufgezählt und mit ihren Verbreitungsangaben kurz skizziert sind). Von *Ackermania* unterscheidet sich *Senghasia* übrigens eindeutig durch den gänzlich anderen Kallus und einen kürzeren Säulenfuß.

Senghasia SZLACH., **nom. nov.**, ersetzter Name für *Kefersteinia* RCHB.f. sect. *Umbonatae* SENGH. & GERL., SENGHAS, in R. SCHLECHTER, Die Orchideen, 3. Aufl., Bd. **IC**, S. 1641, 1992 (Art. 20.2, ICBN).

Typus: *Senghasia wercklei* (SCHLTR.) SZLACH.
Etymologie: benannt nach Dr. Karlheinz SENGHAS, Akad. Direktor a. D. am Botanischen Garten Heidelberg, einem bedeutenden Orchidologen.