

7. *Sievekingia colombiana* Garay, sp. nov.

Epiphytica, usque ad 30 cm. alta; radicibus filiformibus flexuosis, glabris; pseudobulbis aggregatis, ovoideis, obtuse angulatis, cataphyllis jam emarcidis, circumdatis, unifoliis, usque ad 4 cm. longis; foliis satis longe petiolatis, ellipticis vel oblongo-ellipticis, plicatis, acutis, petiolo inclusu usque ad 25 cm. longis; inflorescentia reflexa, breviter pedunculata, superne dense racemosa, pauciflora, 5-6 cm. longa; bracteis ovato-cucullatis, obtusiusculis. 1 cm. longis; floribus campanulatis, pallide roseo-flavidis cum labello aurantiaco basin purpureo guttato notatis; sepalo postico concavo, elliptico-oblongo, acuto, extus brunneo-furfuraceo, 30 mm. longo, 9 mm. lato; sepalis lateralibus concavis, obliquis, oblongo-subfalcatis, acutis, extus brunneo-furfuraceis, 30 mm. longis, 10 mm. latis; petalis oblongo-linearibus, apicem versus subspathulatis, acutis, margine eroso denticulatis, supra basin cuneatis, utrinque obtusangulis, 27 mm. longis, 4.5 mm. latis; labelo 3-lobo, valde concavo, basin leviter gibboso; lobis lateralibus erectis, subfalcato-triangularibus; lobo intermedio triangulari-lanceolato, acuminato; disco basin 5 costato, breviter carinato, antice callo V-formi, bifido ornato; toto labelo 20 mm. longo latoque; columna gracili, leviter arcuata, subclavata, obtuse alata, 18 mm. longa; ovario pedicellato 25 mm. longo.

Colombia: Depto. de Antioquia, Yolombó 900 Mtrs. altura Coll.: Gilberto Escobar Nº 299 Tipo! (AMES) material típico cultivado por Alvaro Mejía en Medellín.

Esta atractiva especie está muy cercanamente relacionada a *S. Jenmanii* Rchb. f de la Guayana. Sin embargo difiere en los triángulo-falciforme lobulos laterales del labelo, como también en el menor número y forma de las quillas en la base del labelo. (Ilustración en colores pág. 32 Dibujo en blanco y negro pág. 19)



*Sievekingia
colombiana*, Garay



