

**Sobralia macra** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, macra, c. 60 cm alta; rhizomate valde abbreviato; caulis simplicibus, vulgo leviter flexuosis, teretibus, rigidulis, dimidio inferiore vaginatis, dimidio superiore laxe 5—7-foliatis, vaginis foliorum arce amplectentibus, striatis, nudis omnino obtectis, 3—3,5 mm diametro; foliis erecto-patentibus, anguste lanceolatis, acutis, plicato-nervosis, coriaceis, usque ad 12 cm longis, infra medium ad 2 cm latis, glabris; floribus in apice caulis singulis natis, vaginis angustis, longis, acutis usque ad basin perigonii arce circumdatis; flore in subgenere inter minores, fide collectoris niveo, labello intus luteo-brunneo, glabro, textura tenui; sepalis anguste oblongo-ligulatis, acutiusculis, c. 4,5 cm longis, medio fere c. 8 mm latis, lateralibus obliquis; petalis quam sepala lateralia similibus sed paululo latioribus, basin versus tamen magis angustatis, fere aequilongis; labello columnam amplectente, sepalis fere aequilongo, explanato obovato, antice bilobulato-exciso, basi angustato, dimidio anteriore margine minute denticulato undulato, in quarta parte anteriore 2,5 cm lato, squamis 2 basilaribus exclusis superne nudo; columna semitereti, apicem versus paulo dilatata, 2,5 cm longa, glabra, falcis lateralibus lobo dorsali aequilongis; ovario cylindraceo, glabro, c. 2 cm longo.

Costa Rica: Bois et troncs des paturages à Los Angeles de Heredia, alt. 1500 m — A. M. Brenes no. 295, VIII. 1922. Fleurs blanches à labelle jaune-brun.

Schon habituell ist die Spezies durch ihre sehr schlanke Tracht und die spitzen, schmalen und langen Scheiden der Infloreszenz sehr gut gekennzeichnet. Die Blüten sind kaum so groß wie bei *S. decora* Batem., dabei weiß mit innen gelbbrauner Lippe. Mit Ausnahme der basalen, hier sehr kurzen Randleisten ist die Lippe oberseits nackt.