

56. *Sobralia pleiantha* Schltr., nov. spec.

Erecta, pluricaulis, c. 60 cm alta; caulis teretibus glabris, rigidis, vaginis foliorum arctissime amplectentibus omnino obtectis, 6—8-foliatis; foliis lanceolatis vel lanceolato-ellipticis acuminatis, plicatis glabris, 11—14 cm longis, medio vel infra medium 2—3 cm latis, plicatis, textura rigidulis, vaginis striatis, glaberrimis; racemo abbreviato 2—4-floro, spathis brevibus glabris, bracteis imbricatis suborbicularibus, apice breviter excisis, lucidis, ovario bene brevioribus; floribus in genere mediocribus tenuibus; sepalo intermedio lanceolato-ligulato acuto glabro, c. 3,3 cm longo, lateralis aequilongis subfalcatis, acutis, glabris; petalis oblique ob-lanceolato-subspathulatis obtusis, glabris, sepalis fere aequilongis; labello cuneato-ovato indiviso, obtuso, margine apicem versus undulato-subcrenulato, intus sparsim setulis pallidis piloso, c. 3,3 cm longo, supra medium c. 2 cm longo, ecarinato; columna gracili apicem versus ampliata, 1,7 cm longa, glabra, clinandrio trilobo, lobis lateralibus lanceolatis falcato-recurvis, intermedio humili triangulo, apiculato; anthera cucullata, dorso gibbo donata, antice breviter 2-dentata; ovario cylindrico, glabro, c. 2,3 cm longo.

✓Costa-Rica: In dem Walde bei Boruca, c. 450 m ü. d. M. — H. Pittier no. 3855; blühend im Februar 1891.

Besonders interessant ist diese Art dadurch, dass sie, obgleich habituell den Arten gleich, welche ihre Blüten nur einzeln hervorbringen, mehrblütige verkürzte Blütenstände hat.