

175. **Solenocentrum** Schltr., nov. gen.

Sepala patentia, inaequalia, intermedium lanceolatum, acutum, lateralia basi margine anteriore in lobum anguste oblongum amplum, liberum producta. Petala deflexa-patentia e basi cuneata inaequaliter bilobata. Labellum parvulum superum semilunatum, calcaratum, calcare erecto fistuloso, bene evoluto. Columna illae *Cranichidis* bene similis, brevis, rostello digitiformi, erecto, stigmatate simplici, pulvinato. Anthera oblongo-cucullata obtusa erecta. Pollinia ut videtur 2 clavata, granulosa, glandulae parvulae sine stipite affixa.

Species adhuc nota una costaricensis.

Herba erecta, verosimiliter e radicibus fasciculatis; caule crassiusculo, basi foliis c. 5 circumdato, caeterum vaginis amplectentibus obesso; spica dense multiflora cylindrica, elongata; floribus inversis, patentibus.

Es scheint mir keinem Zweifel zu unterliegen, dass diese neue Gattung neben *Pseudocentrum* unterzubringen ist. Von diesem unterscheidet sie sich durch die vom Lippensporn freien seitlichen Sepalen und durch die eigentümlich zweilappigen Petalen. Bei *Pseudocentrum* wird bekanntlich der Sporn durch Verwachsung der seitlichen Sepalen gebildet und das Labellum selbst ist ungespornt.