

Pl. asperilinguis (Elongatae Racemosae Trisepalae):
aff. *Pl. aureae* tepalis trinerviis, labello cuneato oblongo
quinquenervi ante apicem papulis acutis aspero, medio
utrinque obliquo marginaliter carinato, anthera apiculata.
Spithamaea. Caulis in sicca planta obscurus, infra a
vaginis 3—5 vestitus, supra summam elongatam acutam
nudus. Folium oblongum apiculatum basi cuneatum ra-
cemo subdimidio brevius, bene coriaceum, bipollicare,
medio prope dimidiatum pollicem latum. Spatha mem-
branacea acuta trilinearis in basi racemi basin usque
floridi, —10 flori; 3—4 pollicaris. Bracteae ochreate apice
retuso apiculatae. Mentum rectangulum. Sepalum summum
triangulum apice lineare, inferiora subaequalia, basin
usque divisa. Tepala a cuneata basi ovata acuta tri-
nervia. Labellum a basi angustiori oblongum acutius-
culum, 5 nerve, ante apicem papulis acutis asperum,
carinula obliqua brevi extrorsa utrinque ante medium
marginem; gynostemio alato, androclinio cucullato den-
ticulato; anthera apiculata. Blüten gelb, halb so gross
als die der *Pl. aurea*. Peru.