

Pleurothallis R. Br.

P. barboselloides Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, pusilla, florifera c. 7 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flevuosis, glabris; caulis abbreviatis, vaginis 2 arce amplectentibus omnino obtectis, 8—10 mm longis, vix 1 mm diametro; folio erecto, oblanceolato-ligulato vel anguste oblongo, obtusiusculo vel subacuto, basi sensim in petiolum, usque ad 1,2 cm longum angustato, petiolo inclusio 3—5 cm longo, medio vel supra medium 7—10 mm lato; scapis singulis, folium plus minusve superantibus (vulgo dimidio), setiformibus 1—2-floris; bracteis oblongo-cucullatis, apiculatis, ovario longipedicellato 3—5-plo brevioribus; floribus in genere mediocribus, glabris, flavis, illis *P. pyrsodes* Rehb. f. similibus; sepalo intermedio anguste oblongo, obtuso, dorso nervis 3 incrassatis ornato, 8 mm longo, lateralibus in laminam oblongam breviter et obtuse bifidam 8 mm longam connatis; petalis breviter et valde oblique ovalibus, obtuse apiculatis, margine anteriore medio dilatatis, basi breviter decurrentibus, 2,75 mm longis; labello linguiformi, obtuso, e basi angustata infra medium paulo dilatato marginibus paucicrenulato, caeterum integro, vix 3,25 mm longo; columna vix mediocri, 2,25 mm longa, clinandrio denticulato; ovario cum pedicello gracili multo longiore usque ad 1,2 cm longo, glabro.

Panama: Auf Hügeln bei Panama-City — no. 98.

Ohne Zweifel gehört die Art in die nähere Verwandtschaft von *P. pyrsodes* Rehb. f. Verschieden ist sie von ihr durch die kurzen Stengel, die längeren Blütenschäfte, gelbe Blütenfärbung, kürzere und breitere Petalen mit stumpfem Apiculus, die unterhalb der Mitte an den Rändern gekerbt Lippe und die etwas höhere und schlankere Säule.