

***Specklinia rubidantha* Chiron & Ximenes Bolsanello, sp. nov.**

Haec species Anathallis barbulate (Lindley) Pridgeon & M.W. Chase similis est, sed inflorescencia folio multo longiore, sepalis lateralibus dorsale paulo brevioribus, petalis insigniter brevioribus latioribusque, labello glabro differt.

Holotype

Brésil, Espírito Santo, Mun. Domingos Martins, Biriricas, 200-600 m d'altitude, 20°19,0' Sud, 40°35,0' Ouest, collecté par Renato Ximenes Bolsanello, n°090511 ex Chiron09381 (holotype : MBML, isotype : LY).

Description

Petite plante cespiteuse, **tiges** secondaires très courtes, quelques millimètres de longueur, et fines, unifoliées à l'apex ; **feuille** plane, coriace, elliptique, brièvement atténuée à la base, environ 8 mm x 4 mm, carénée au dos, apex arrondi et très légèrement échancré ; **inflorescence** issue d'une gaine courte à la base de la feuille, dressée, nettement plus longue que la feuille, pédoncule fin, 15 mm de longueur, plusieurs fleurs émergeant successivement du même point, situé au sommet du pédoncule, une seule fleur à la fois ; pédicelle 4,0-4,5 mm de longueur, bractée florale 1,2 mm, triangulaire, aiguë ; ovaire triquètre, court, à peine 1 mm de longueur ; **fleur** petite, ouverte, entièrement glabre, rouge cuivré, avec les extrémités des sépales et la base des pétales moins foncées, légèrement jaunissantes ; **sépales** ovales, obtus, uninervés, le dorsal 3,2 x 1,2-1,3 mm, les latéraux légèrement plus courts ou de même longueur, soudés sur les trois quarts de leur longueur ; **pétales** ovales, aigus, 2,2 x 1,1 mm, les marges légèrement denticulées ; **labelle** articulé au pied de la colonne, linguiforme, à peine trilobé, les lobes latéraux triangulaires arrondis, redressés, le lobe médian arrondi à l'apex, avec une callosité médiane linéaire en creux, dimensions hors tout du labelle étalé 2 x 1 mm ; **colonne** un peu arquée, claviforme, l'apex très découpé, la base amincie, pied court, anthère et cavité stigmatique ventrales. – Fig. 3 et ph. page 120.

Etymologie

L'épithète spécifique se rapporte à la couleur générale de la fleur et vient du latin *rubidus* (rouge cuivré) et du grec *anthos* (fleur).

Distribution géographique

Cette espèce n'a jusqu'ici été trouvée que dans les restes de Mata Atlântica proches de Biriricas, Mun. de Domingos Martins (ES), dans la Serra do Castelo, à des altitudes comprises entre 200 et 600 m. Elle fleurit en décembre-janvier.






Fig. 3 : *Specklinia rubidantha* Chiron & Ximenes Bolsanello

dessin Guy Chiron d'après type (Brésil, *Ximenes090511* ex *Chiron09381*)

a : plante – b : fleur (1 : position naturelle – 2 : pétales écartés) – c : sépale dorsal – d : sépales latéraux – e : pétale droit – f : labelle (1 : position naturelle – 2 : étalé) – g : colonne