

63. **Pleurothallis listerophora** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, pusilla, caespitosa, 6—9 cm alta; rhizomate valde abbreviato, radicibus flexuosis glabris; caulis gracilis exsiccatione (?) subangulatis, infra medium univaginatis, glabris, folio fere aequilongis vel paulo brevioribus, vagina arcte amplectente; folio oblanceolato-lineari obtuso, basin versus sensim angustato, 2,3—4,3 cm longo, supra medium 0,4—0,7 cm lato, glabro, textura crasse coriaceo; racemis vulgo singulis, paucifloris (1—2-floris), folio 2—4-plo brevioribus, pedunculo vaginulatis paucis dissitis obsesso, glabro; floribus erectis in genere vix inter mediocres; sepalis oblongo-ligulatis obtusis, utrinque glabris, subliberis, c. 3,5 mm longis, textura vix carnosulis, lateralibus obliquis subfalcatis; petalis subfalcatis cuneato-spathulatis, apice truncato-obtusissimis, textura sepalis tenuioribus, glabris, 0,2 cm longis; labello longius unguiculato, ungue carnosulo linearis, in laminam decurrente, lamina oblonga obtusa glabra, lineis 2 incrassatis ornata, labello toto 0,2 cm longo, lamina vix 0,1 cm longitudine excedente; columna paulo curvata gracili, clinandrio dorso paulo ampliato triangulo, acuto, serrulato-denticulato; anthera cucullata dorso gibbo donata, glabra; ovario cylindraceo, glabro, c. 0,3 cm longo.

Costa-Rica: Bei La Uruca, blühend im Juli 1890 — H. Pittier no. 2986.

Diese Art zeichnet sich vor allen anderen der Untergattung *Anathallis* durch die lang genagelte Lippe aus; sie gehört offenbar in die Nähe der brasiliianischen *P. osmosperma* Cogn.