

Stelis Bradei Schltr. n. sp.

Epiphytica, erecta, parvula, c. 12 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulibus erectis, biarticulatis, usque ad 3 cm longis, 1,5 mm diametro, vaginis 2 arcte amplexantibus, apiculatis omnino obtectis; foliis erectis, oblanceolato-ligulatis, basi sensim in petiolum satis longum attenuatis, coriaceis, petiolo incluso 4,5—6 cm longis, supra medium 9—12 mm latis; racemis singulis è spatha parvula, pedunculo vaginula brevi medio fere donato, ad 3 cm longo, racemo ipso secundo dense multifloro, ad 7 cm longo; bracteis cucullato-reniformibus, apiculatis, ovarium paulo superantibus; floribus parvulis, c. 4,5 mm diametrentibus; sepalis perlate ovato-rhombeis, obtusis, trinerviis, c. 2 mm longis, lateralibus obliquis; petalis quam sepala fere 5-plo brevioribus oblique suborbicularibus, obtusis, apice incrassatis, sessilibus; labello late reniformi, valde obtuso, petalis duplo majore, tertia parte basilari incrassato, concavo, incrassatione basilari antice abrupte truncata obscure bilobulata ornato; columna brevi, apicem versus dilatata, apice trilobata, lobis obtusis; ovario cum pedicello aequilongo cylindraceo, pedicello incluso c. 2 mm longo.

C o s t a R i c a: Carpintera. — C. B r a d e , im April 1908.

Nahe verwandt mit der unten beschriebenen *S. rhodochila* Schltr. und wie diese offenbar gelbblumig mit roter Lippe. Auf die Unterschiede zwischen den beiden Arten gehe ich bei der Beschreibung der letzteren näher ein.