

***Stelis chiriquensis* Schltr. n. sp.**

Epiphytica, erecta, gracilis, c. 20 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulibus gracilibus, biarticulatis, unifoliatis, vaginis 2 alte et arcte amplexantibus obsessis, 6—8 cm longis, 1,5—2 mm diametentibus; foliis erectis, lineari-lanceolatis, obtusiusculis, basi sensim in petiolum gracilem, 2,5—3 cm longum attenuatis, glabris, tenue coriaceis, lamina 7—8 cm longa, medio fere 5—8 mm lata; racemis singulis, erectis, subaxe multifloris, secundis, folium haud vel paulo superantibus, pedunculo brevi, 1,5—2 cm longo; bracteis ovato-cucullatis, breviter acuminatis, ovario cum pedicello subaequilongis; floribus in sectione inter minores, glabris, pallide flavidis; sepalo intermedio oblongo, obtusiusculo, trinervio, 3 mm longo, lateralibus oblique ovatis, obtusiusculis, trinerviis, c. 2,25 mm longis; petalis minutis, cuneato-obovatis, apice incrassato truncato-obtusissimis, obliquis; labello semiovali, carnosio, antice excavato, apice triangulo, breviter acuminato, petalis subminore; columna perbrevis, crassa, apicem versus valde dilatata, apice trilobata, lobis lateralibus divergentibus, intermedio (dorsali) erecto, oblongo, apice paucidentato; ovario incurvo cum pedicello glabro, c. 2 mm longo.

P a n a m a: Humid forest between Alto de las Palmas and top of Cerro de la Horqueta, Chiriqui, 2100—2268 m. — H. Pittier n. 3228, March 1911.

Zur Gruppe der *Labiatae* nach Lindley gehörig und mit *S. despectans* Schltr. und der unten beschriebenen *S. nutantiflora* Schltr. verwandt. Von beiden durch das Labellum und die Säule gut unterschieden.