

**P. Powellii** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, florifera c. 60—70 cm alta; rhizomate valde abbreviato; caule erecto, stricto, tereti, vaginis 2 alte et arcte amplectentibus distanter obsesso, c. 30 cm longo, 5 mm diametro; folio erecto, oblongo-elliptico; subacuta, basi cuneato-rotundato, sessili, coriaceo, 22—25 cm longo, medio fere 7,5—8,5 cm lato; inflorescentia singula, erecta, pedunculo paucivaginulato, 15—18 cm longo, tereti, racemo secundo, sublaxe multifloro, usque ad 30 cm longo; bracteis ovalibus, apiculatis, ovarium fere aequantibus; floribus in genere inter majores, atrovinosi, glabris; sepalo intermedio ligulato, acuto, 3-nervio, 1,6 cm longo, laterali-bus bene latioribus, in laminam late ovalem, cymbiformem apice breviter excisam, obtusam connatis, 1,6 cm longis; petalis subfalcatis, oblongo-spathulatis, obtusis, 3-nerviis, 6,5 mm longis; labello rhombeo-ovali, obtuso, e basi usque in tertiam partem apicalem carinis 2 parallelis ornato, 4,5 mm longo, medio fere 2,25 mm lato; columna leviter curvata, 4,5 mm longa, clinandrio dorso alto, triangulo, acuminato, pede satis longo; ovario cum pedicello duplo longiore c. 7 mm longo, glabro.

Panama: Chiriqui-District, c. 4000 Fuß ü. M. — no. 146.

Eine sehr eigenartige auffallend große und kräftige Spezies, die vielleicht mit *P. grandis* Rolfe von Costa Rica (die ich noch nicht kenne), verwandt ist, sich aber durch die Färbung und Form der Blüten und durch das Labellum unterscheiden muß.

Die Färbung der Blüten ist dunkelweinrot.