

S. Isthmi Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, florifera usque supra 20 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulibus brevibus, vaginis 2 alte amplexantibus, bruneis omnino obtectis, 1—1,3 cm longis, vix 1 mm diametro; folio erecto, oblanceolato, obtuso, basi in petiolum brevem angustato, carnoso-coriaceo, petiolo incluso 6,5—8 cm longo, medio fere 7—10 mm lato; inflorescentiis singulis erectis, folium fere duplo excedentibus, pedunculo paucivaginulato folium fere aequante, pergracili, racemo dense multifloro, secundo, fere aequilongo; bracteis ovali-cucullatis, apiculatis, ovarii pedicellum fere aequantibus; floribus in genere inter minores, c. 2,8 mm diametro, purpureis; sepalis ovatis, obtusiusculis, 3-nerviis, intus margines versus minute papillosis, 3-nerviis, lateralibus obliquis; petalis, quam sepala multo minoribus, uninerviis, oblique et transverse ovalibus, obtusissimis, apicem versus vix incrassatis; labello e basi semiovali-triangulari sensim incrassata, dimidio anteriore subito contracto et tenuiore, quadrato, antice truncato, petalis aequilongo, medio transversim carinato; columna petalis aequilonga, apicem versus vix incrassata, lobis lateralibus truncatis minutis, clinandrio dorso humili; ovario cum pedicello aequilongo glabro, vix 1 mm longo.

Panama: Bei Arrajan, westlich des Kanals, ungefähr auf Seehöhe -- no. 232.

Am nächsten steht die Art der *S. crescenticola* Schltr., die ebenfalls von Panama stammt. Sie hat aber längere Blütentrauben und ist außerdem spezifisch gut gekennzeichnet durch die anders konstruierte Lippe und die schmalere Säule.

Die Blüten sind purpurrot.