

253. **Pleurothallis Türckheimii** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, 45—60 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; caulis erectis, teretiusculis, vaginis 2 alte amplectentibus distantibus obsessis, 25—30 cm longis; folio oblongo-elliptico, obtuso, basi in petiolum brevem angustato, glabro, 14—23 cm longo, medio fere 4,7—6,5 cm lato; racemis vulgo singulis, laxe multifloris, folium vulgo plus minus superantibus, usque ad 30 cm longis, usque supra basin floriferis; spatha late ovali, compressa, satis magna, 4—5 cm longa; bracteis deltoideis, obtusis, glabris, ovario pedicellato plus duplo brevioribus; floribus in genere inter maiores, extus minutissime papilloso-puberulis; sepalo intermedio lanceolato, acuto, c. 2,1 cm longo, lateralibus in laminam oblongam, antice breviter bifidam connatis, intermedio aequilongis; petalis oblique ovalibus obtusis, apice minute papillosis, trinerviis, 0,6 cm longis; labello e basi sagittata carnoso, ligulato-rostrato, obtusiusculo, glabro 0,8 cm longo, auriculis basilaribus tenuibus triangulis obtusis; suberectis; columna brevi, cum clinandrio trilobulato elato vix 0,3 cm alta, pede c. 2 mm longo; anthera rotundato-cucullata, antice retusa, dorso gibbo obtuso papilloso donata; ovario cum pedicello clavato, glabro, minute papilloso-puberulo, c. 0,8 cm longo.

✓Guatemala: Epiphytisch im Hochwald bei Coban, c. 1600 m. ü. d. M. — H. v. Türkheim no. II, 1996, blühend im November 1907.

Eine recht ansehnliche Art der Gattung nach Angabe des Entdeckers mit lebhaft rotbraunen Blüten. Die Art erinnert an *P. Roeszlii* Rehb. f., hat aber kleinere Blüten mit schmäleren Sepalen und einem recht verschiedenen gestalteten Labellum. Es sind auch deutliche Annäherungen an *P. formosa* Schltr. vorhanden.