

***S. praeinorsa* Schltr., nov. spec.**

Epiphytica, erecta, c. 13 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulibus satis brevibus, vaginis 2 alte amplexantibus, atrobrunneis omnino obtectis, 1,5 mm diametro, 1,7—2 cm longis; folio erecto anguste oblanceolato, obtuso, basi sensim in petiolum angustato, petiolo incluso 7—8 cm longo, supra medium 7—9 mm lato; racemis singulis erectis vel leviter curvatis, folium dimidio fere excedentibus, pedunculo pergracili, c. 5 cm longo, paucivaginulato, racemo fere aequilongo, secundo, subdense multifloro; bracteis ovali-cucullatis, apiculatis, ovarii pedicellum subexcedentibus; floribus in genere inter minores, glabris, virescenti-flavidis, basi purpurascentibus, vix 2,5 mm diametro; sepalis ovalibus, obtusis, 3-nerviis, lateralibus obliquis, intermedio sub brevioribus; petalis quam sepala multo minoribus, uninerviis, obliquis, e basi perlate cuneata, transverse ovalibus, obtusissimis, apicem versus vix incrassatis; labello late cuneato, antice praemorso subtridentato, usque infra medium ab apice excavato, caeterum et marginibus incrassato, petalis haud majore; columna petalis aequilonga, apicem versus paulo dilatata, glabra, lobis lateralibus truncatis parvulis, clinandrio semiorbiculari-triungulo paulo altiore; ovario cum pedicello aequilongo vix 1 mm longitudine excedente, glabro.

Panama: Auf Hügeln, östlich von Panama-City — no. 234.

Im Habitus erinnert die Art stark an *S. crescentiicola* Schltr., ist aber in der Lippe vollkommen verschieden und dadurch recht gut charakterisiert. Die Blüten sind gelbgrün, nach dem Grunde rötlich.