

## 24. *STELIS RICTUS* O. Duque sp.nov

(Figura 24. Fotos 65 y 66)

*Planta mediana, caespitosa, epiphytica, floribus flaviis, sepalum latelare efformati sinsepalum. Flores aperiun, tur tantum partim.*

**Tipo:** colectado por José I. Acosta en árboles de monte húmedo en Bahía Solano, departamento del Chocó, Colombia. Mayo 8, 2002. O. Duque N° 2468. Holotipo JAUM.

**Descripción:** **Planta** mediana hasta 30 cm de altura, epífita, cespitosa. **Raíces** delgadas. **Ramicales** de 6,5 cm de largo, cubiertos por 2 o 3 vainas fibrosas secas. Annulus. **Hoja:** la lámina de 8 x 2,7 cm, elíptica, gruesa, estriada, la vena central notaria, carinada, el ápice obtuso y tridenticulado, se estrecha abajo en un corto pecíolo de 0,8 cm de largo. **Inflorescencia:** única de 15 cm, de una espata aguda por debajo del annulus; pedúnculo de unos 3 cm; racimo dístico, con pocas flores esparcidas; brácteas florales muy anchas de 5,5 mm, los bordes doblados. Ovario pedicelado de 5 mm. **Flores:** grandes, no resupinadas, amarillas, solo semiabiertas. **Sépalos:** unidos en la base, el dorsal aovado, agudo, con 9 venas, 9 mm de largo y de ancho, los sépalos laterales unidos hasta la punta en un sinsépalo, cada mitad 8 mm de largo y de ancho con 10 venas. **Pétalos:** 1,8 mm de alto, 2,2 mm de ancho, transversalmente oblongos, los bordes laterales forman un ángulo con la línea transversa que sobresale sobre los lados del margen curvo, 3 venas. **Labelo:** 1 mm de largo, 1,5 mm de ancho, visto por encima es oblongo, el disco limitado por una barra transversal dividida por el glenión, unido atrás a un callo trilobado, curvo, diminuto piloso. **Columna:** ancha arriba 1,5 mm, 1,1 de largo, con un corto pie, los lóbulos estigmáticos prominentes, separados.

**Etimología:** del latín, *ringor*, mantener la boca abierta como en un espasmo. Esta flor permanece parcialmente boquiabierta.




Figura 24.



*STELIS RICTUS*

- A. Planta. B. Sépalos. C. Inflorescencia. D. Aparato Central de la flor. E. Antera.  
 F. Polinario. G. Labelo (vientre y perfil). H. Pétalo. I. Columna (vientre).  
 J. Columna y labelo (de lado).

**Comentarios:** *S. Rictus* se puede reconocer principalmente por su flor grande, amarilla y parcialmente boquiabierta, por sus grandes brácteas puntudas, y por su ovario que se curva para colocar la flor de un lado u otro del raquis.

## SUMMARY

A medium sized 30 cm tall plant, epiphytic, caespitose. Ramicauls 6.8 mm covered by fibrous sheaths. **Leaf:** elliptic, obtuse, tridenticulate with a short petiole. **Inflorescence:** solitary, some 15 cm long, the peduncle 3 cm, the raceme sparsely flowered, distichous; floral bracts large, the edges folded downward, the pedicelled ovary curved. Flowers large, yellow. **Sepals:** 9-10 veined, ovate, the lateral sepals forming a synsepal; the flowers open only partially. **Petals:** transversely oblong, 3 veined. **Lip:** vertically oblong, with a 3-lobed callus. **Column:** broad with a small foot, the stigmatic lobes separate.



*STELIS RICTUS*

Fotos: 65. Planta, 66. Espiga con flores