

Stelis seleniglossa Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, parvula, usque ad 12 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulis teretibus, glabris, vaginis 4 arce amplectentibus, apiculatis omnino obtectis, usque ad 4,5 cm longis, 1,5 mm diametro; folio erecto, anguste oblanceolato, obtuso, basin versus sensim petioliformi-angustato, glabro, usque ad 5 cm longo, supra medium ad 4,5 mm lato; inflorescentia singula, folium aequante vel paululo superante, pedunculo perbrevi, paucivaginulato, racemo ipso subdense multifloro; bracteis cucullato-ovatis, acutis, ovarium subexcedentibus; floribus in genere inter minores, glabris, c. 2 mm diamentibus; sepalis late ovato-rhombeis, obtusis, 3-nerviis, lateralibus

F. Fedde, Repertorium specierum novarum. Beiheft XIX.

obliquis, intermedio paululo angustioribus et forsan brevioribus; petalis minutis, oblique obovato-cuneatis, apice truncata carnoso-incrassatis, uninerviis, quam sepala multoties minoribus; labello minuto, lunato-reniformi, obtusissimo, carnoso, callis 2 obscuris medianis donato; columna brevi, dimidio superiore subito valde dilatata, lobis lateralibus oblique ovato-triangulis, subacutis, dorsali semiorbiculares, vix longiore; ovario pedicellato glabro, c. 1 mm longo, cylindraceo.

Costa Rica: La Palma, um 1400 m ü. M. — A. u. C. Brade no. 1207, blühend im Dezember 1908.

Unter dieser Nummer erhielt ich von Herrn Brade zwei Pflanzen, die vielleicht nicht zusammengehören. Die eine von ihnen, die ich in der Beschreibung nicht berücksichtigt habe, ist (vielleicht auch durch Insektenanstich) autogam mit scheinbar geschlossenen Blüten. Der Typus besteht danach also gewissermaßen nur aus einer Pflanze in meinem Herbar.