

**Stelis subinconspicua** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, perpusilla, 3—4 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, tenuibus, flexuosis, glabris, caulibus 4—7 mm longis, gracilibus, vagina arcute amplexente primum obtectis, vix 1 mm diametro; folio erecto, lineari, obtusiusculo, basin versus sensim paulo in petiolum 4—6 mm longum angustato, petiolo incluso 1,8—2,8 cm longo, supra medium 3,5—5 mm lato; racemo singulo, tenuissimo, nunc folium aequante, nunc paulo superante, pedunculo setiformi brevi, racemo flexuoso laxius 6—12-floro; bracteis deltoideo-cucullatis, apiculatis, ovario aequilongis; floribus minutis, glabris, c. 2 mm diametro; sepalis oblongis, obtusis, 3-nerviis, lateralibus paulo obliquis; petalis oblique suborbicularibus, valde obtusis, uninerviis, quam sepala 6—7-plo brevioribus; labello e basi cuneata late obovato, obtusiusculo, medio gibbis 2 rotundatis ornato, carnosulo, petalis paulo majore; columna brevi, crassiuscula, apicem versus valde dilatata, petalis fere aequilonga, lobis lateralibus adscendenti-divergentibus, obtusiusculis, dorsali quadrato, obtusissimo, laterales paulo excedente; ovario pedicellato glabro, cylindraceo, c. 1,25 mm longo.

Costa Rica: San Jeronimo — C. Wercklé, im Jahre 1922.

Neben *S. bryophila* Schltr. die kleinste Art der Gattung im Gebiete. Sie steht bisher ganz isoliert, es sei denn, daß man ihr neben *S. effusa* Schltr., einer bedeutend größeren Art, einen Platz anweisen wolle.