

83. *Stelis tricuspis* Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, humilis, 10—15 cm alta; rhizomate valde abbreviato, polyrhizo: radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; caulibus secundariis vaginis pluribus alte amplexantibus breviter acuminatis obtectis, glabris, 2—3,5 cm altis; folio erecto, oblanceolato-spathulato obtuso, basi in petiolum sulcatum sensim angustato, glabro, textura coriaceo, 2,5—5 cm longo, supra medium 0,3—0,6 cm lato; spicis erectis folium vulgo fere dimidio excedentibus, singulis, distichis, subdense multifloris, pedunculo brevi vaginis hyalinis pluribus approximatis subnecto; bracteis hyalinis ovato-lanceolatis acuminatis, flores superantibus; floribus pallidis in genere inter minores; sepalis ovato-lanceolatis acuminatis, glabris, textura tenuibus, ima basi tantum connatis, 0,2 cm longis; petalis minutis oblique cuneatis apice truncatis, ad angulos in lobulum brevem expansis; labello carnoso circuitu oblongo-quadrato antice tricuspidato, cuspidibus lateralibus intermedio paulo minoribus, glabro medio longitudinaliter foveolato; columna brevi apice brachiis 2 falcato-triangulis adscendentibus brevibus ornata; anthera cucullata, glabra; ovario cylindraceo glabro, c. 1,5 mm longo.

Costa-Rica: Bei La Uruca — H. Pittier no. 949; blühend im Juli 1888.

Vor allen Arten des Gebietes durch die langen Brakteen und das vorn dreispitzige Labellum ausgezeichnet.