

208. **Telipogon Biolleyi** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, pusilla, subacaulis; radicibus filiformibus, elongatis, flexuosis, glabris; foliis 4—5, erecto-patentibus, lanceolato-ellipticis, oblique acuminatis, basin versus angustatis, 2—2,5 cm longis, medio fere 0,5 cm latis; scapis in axillis foliorum natis, erectis, folia subdupo superantibus, teretibus, glabris, vaginulis parvulis, 1—2, dissitis obsessis, 1—2-floris; floribus in genere mediocribus, erecto-patentibus; bracteis deltoideis minutis; sepalis reflexis, lanceolatis acuminatis, glabris, intermedio 1,4 cm longo, lateralibus obliquis, paulo brevioribus et latioribus; petalis erecto-patentibus, oblique rhombeis acuminatis, utrinque minutissime papillosis, margine minutissime papilloso-ciliatis, c. 2 cm longis, medio fere 1,2 cm latis; labello subreniformi-ovato, acuto, basi biauriculato, incrassatione basali oblonga dense papilloso-pilosa, nervis radiantis basi incrassatis, lamina basi papilloso-puberula apicem marginibusque versus glabrescente, margine minutissime papilloso ciliato, 1,5 cm longo, infra medium latitudine 0,2 cm subattigente; columna brevi, setis longis erectis villosa, clinandrio trilobato, lobo dorsali lateralibus majore, rhombo; rostello subulato; anthera cordata, glabra; polliniis oblique oblongis, compressis, stipite apice conspicue dilatato, glandula oblonga; ovario cum pedicello glabro, c. 2 cm longo.

✓ Costa-Rica: In den Wäldern des Vulcan Barba. — Biolley no. 1340, blühend im August 1889.

Habituell unschwer von *T. costaricense* Schltr. durch die verkürzten Stengel und durch die Blütenteile zu unterscheiden.