


TELIPOGON BUTCHERI Dodson & Escobar, sp.nov.

TIPO: **PANAMA:** CHIRIQUÍ: Cordillera, unas 4 millas al este del volcán, ca. 1500 m, 2 oct. 1960, *H.P. Butcher sn* (RPSC holotipo, AMES isotipo).



Telipogon butcheri Dodson & Escobar
Dibujo: Barbara Culbertson

Similis *Telipogonis seibertii* Dodson & Escobar a quo differt floribus multo minoribus, petalis 9-venatis et absentia intumescenciae in basi labelli circum columnam.

ETIMOLOGIA: En honor del Sr. Henry Butcher, recolector de orquídeas de Panamá.

DISTRIBUCION: Panamá.

Planta pequeña, cespitosa; tallos de hasta 0.8 cm de largo, con raíces en la base. Hojas estrechamente elípticas, agudas, acuminadas en el ápice, estrechadas hacia la vaina, de hasta 2.5 x 0.5 cm. Inflorescencia terete, de hasta 4 cm de largo, no ramificada, brácteas poco notorias, con 1-3 flores sucesivas. Flores de hasta 2 cm de diámetro, resupinadas, amarillas con venas rojo-marrones y escasa reticulación, la columna y la base de los pétalos y del labelo rojo-marrones, las espinas setosas blancas. Sépalos iguales, estrechamente ovados, de 0.7 x 0.3 cm; pétalos ovados, acuminados, de 1.4 x 0.9 cm., con 9 venas de ordinario no ramificadas pero con reticulación; labelo ovado, obtuso, apiculado, con 13 venas con escasa reticulación, de 1.4 x 1.1 cm, la base rojo-marrón oscuro; columna ancha con lóbulos laterales hinchados, rojo-marrón, con 3 cortos haces setosos de espinas blancas de igual tamaño, polinios 2 en dos pares iguales, amarillos.

CARACTERES DISTINTIVOS:

Escapo terete.

Pétalos con 8-9 venas; labelo con 13 venas.

Callo ausente.

Columna corta, gruesa, con haces de espinas blancas.

Planta cespitosa.

NOTAS: Semejante a *Telipogon seibertii* Dodson & Escobar, pero diferenciado de éste por las flores mucho más pequeñas, los pétalos con 9 venas, y la falta de protuberancia en la base del labelo alrededor de la columna.