

TELIPOGON CHIRIQUENSIS Dodson & Escobar, sp. nov.

TIPO: **PANAMA:** CHIRIQUI: Epífita, pocos km arriba de Guadalupe, 2500 m, 13 sept. 1976, *Luer & Butcher 1208* (RPSC!).

Similis *Telipogonis elcimeyae* Brass & Horich, a quo differt inflorescentia elongata et petalis et labello angustis atque magis acuminatis.

ETIMOLOGIA: Su nombre se deriva de la Provincia en que fue colectada la planta.

DISTRIBUCION: Panamá.

Planta pequeña, subcaulescente, tallos de hasta 4 cm de largo, con raíces a lo largo del tallo. Hojas angostamente elípticas, agudas, acuminadas en el ápice, estrechadas hacia la vaina, no articuladas, de hasta 3 x 0.7 cm. Inflorescencia terete, de hasta 25 cm de largo, ocasionalmente ramificada, brácteas poco notorias, con 5-12 flores sucesivas. Flores de 2 cm de diámetro, resupinadas, sépalos amarillos con morado, pétalos y labelo amarillos con tintes morados, con venas moradas y abundante reticulación, la columna y la base del labelo moradas. Sépalos iguales, angostamente ovados, de 0.9 x 0.3 cm; pétalos ovados, acuminados, de 1 x 0.5 cm, con 9 venas generalmente no ramificadas pero con reticulación; labelo anchamente elíptico, apiculado, con 13 venas y abundante reticulación, de 1 x 1.2 cm, la base no hinchada; columna terete, de color rojo opaco, con 3 haces cortos de espinas de igual tamaño, de color rojo opaco, el borde inferior del estigma extendido; polinios 4 en dos pares iguales, amarillos.

CARACTERES DISTINTIVOS:

Escapo terete.


Pétalos con 9 venas; labelo con 13 venas.

Callo ausente.

Columna corta, gruesa, terete con espinas rojas.

Planta subcaulescente.

OTROS EJEMPLARES VISTOS: **PANAMA:** CHIRIQUI: arriba de Guadalupe, 2000 m. 15 mar. 1985, *Hampshire & Whiteford 620* (K).



Telipogon chiriquensis Dodson & Escobar
Dibujo: Barbara Culbertson

NOTAS: Semejante a *Telipogon elcimeyae* Brass & Horich, del cual difiere por la larga inflorescencia y los pétalos y el labelo angostos y más acuminados.