

180. **Telipogon costaricensis** Schltr., nov. spec.

E basi decumbente erectus; rhizomate cauliformi, tereti; radicibus filiformibus elongatis, flexuosis; caule tereti, laxe foliato, glabro, 4,5—5 mm diametiente, elongato; foliis oblongo-ligulatis, obtusiusculis, glabris, 5—8 cm longis medio fere 0,9—1,2 cm latis, internodia multo superantibus; scapo erecto usque ad 20 cm alto, apice laxe 3—6 floro; bracteis minutis ovato-triangularis, ovario multoties brevioribus; floribus in genere inter majores; sepalis ovato-lanceolatis, acutis, glabris, c. 1,6 cm longis, lateralibus paulo obliquis; petalis suborbiculari-ellipticis acuminatis, glabris, paululo obliquis, 1,6 cm longis, medio fere 1,6 cm latis; labello e basi perlate cuneata reniformi-dilatato, apiculato, basi callo hippocrepi-formi antice cuspidato, glabro ornato, tertia parte basilari pilosulo, 1,6 cm longo, medio fere usque ad 2,2 cm lato; columna perbrevis villosula, dorso in filamentum lanceolatum producta; rostello erecto lanceolato-subulato, glabro; anthera oblonga villosula; ovario longipedicellato, gracili, pedicello incluso usque ad 3 cm longo.

Costa-Rica: Forêts de Général, alt. c. 600 m. — H. Pittier no. 3527, blühend im Januar 1891.

Habituell ist diese Art leicht vor allen anderen zentralamerikanischen leicht zu unterscheiden. Sie ist mit *T. latifolius* H. B. & Kth. verwandt.