



Telipogon panamensis Dodson & Escobar
Dibujo: Barbara Culbertson

TELIPOGON PANAMENSIS Dodson & Escobar, sp. nov.

TIPO: **PANAMA:** CHIRIQUI: Bajo Choro, 1900 m, 20 jul. 1940, *Woodson & Shery 694* (MO!)

Similis *Telipogonis butcheri* Dodson & Escobar, a quo differt labello 19-venato, numerosis lineis reticulatis inter venas labelli et columna tereti infra spinis praedita.

ETIMOLOGÍA: El nombre se deriva del nombre del país en que fue encontrada la planta.

DISTRIBUCION: Panamá.

Planta pequeña, subcaulescente; tallos de hasta 3 cm de largo, con raíces a lo largo del tallo. Hojas angostamente elípticas, agudas, acuminadas en el ápice, estrechadas hacia la unión con las vainas, no articuladas, de hasta 2x1.5 cm. Inflorescencia terete, de hasta 6 cm de largo, no ramificadas, brácteas poco notorias, con 1-2 flores sucesivas. Flores de hasta 4 cm de diámetro, resupinadas, amarillas hasta amarillo-marrones con venas rojo-marrones y abundante reticulación, la columna y la base del labelo rojo-marrones. Sépalos iguales, estrechamente ovados, de 1 x 0.3 cm; pétalos anchamente rómbicos, acuminados, de 1.2-2.5 x 1.2-1.5 cm, con 9-11 venas de ordinario no ramificadas pero con reticulación; labelo anchamente rómbico-ovado, obtuso, apiculado, con 15-19 venas y abundante reticulación, de 1.5-2.2 x 1.9-2.4 cm; columna subterete, rojo-marrón con 3 haces laxos de espinas cortas y de igual tamaño, polinios 4 en dos pares iguales, amarillos.

CARACTERES DISTINTIVOS:

Escapo terete.

Pétalos con 9 venas; labelo con 19 venas y abundante reticulación.

Callo ausente.

Columna alargada, terete, con espinas laxas encima de la antera y debajo del estigma. Planta subcaulescente.

OTROSEJEMPLARES VISTOS: **COSTA RICA:** Cordillera de Talamanca, vertiente del Atlántico, Valle del Silencio, junto al río Terbi, 5-11.5 km al oeste de la frontera entre Costa Rica y Panamá, 2300-2400 m, 9 sept. 1984, *Davidse et al. 28786* (MO).

NOTAS: Semejante a *Telipogon butcheri* Dodson & Escobar, del cual difiere en el labelo con 19 venas, en la abundante reticulación del labelo y en la columna terete con espinas en la parte inferior.

Esta especie fue considerada como *T. dendriticus* Rchb. f. por Allen en su **Flora of Panamá**. *Telipogon dendriticus* es una especie del Ecuador con la cual no tiene relación.