

36. *Teuscheria elegans* Garay, *sp. nov.*

Epiphytica, rhizomate prorepenti, lignescenti, cataphyllis, imbricatis, jam emarcescentibus omnio oblecta; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; pseudobulbis satis distantibus, ovoideis vel subglo-

hosis, cataphyllis scariosis, demum fissis circumdantibus, unifoliatis, usque ad 2.5 cm. altis; folio lineari-oblongo, plicato, acuminato, basin versus sensim in petiolum 5 cm. longum attenuato, petiolo incluso usque ad 35 cm. longo, 1.5 cm. lato; inflorescentia laterali, uniflora; pedunculo perbrevis, 1.5 cm. longo; floribus non resupinatis, conspicuis, semipatentibus; sepalis petalisque roseis, labello albedo venis purpureis ornato, disco flavo; sepalo postico elliptico, apice obtuso, usque ad 1.4 cm. longo, 6 mm. lato; sepalis lateralibus ad pedem columnae oblique adnatis, oblongo-ellipticis, acutis vel obtusiusculis, usque ad 2.5 cm. longis, 7 mm. latis; petalis obovato-oblanceolatis, obtusis, usque ad 1.3 cm. longis, 4.5 mm. latis; labello supero. e cuneata basi 3-lobo, toto superficie minutissime papilloso; lobis lateralibus erectis, columnam envolventibus, semiovatis, obtusis, lobo intermedio sessili, subrotundo, margine undulato, disco in medio callo 3-partito, integro, basin versus in fimbriillas dissoluto ornato; toto labello 2 cm. longo, explanato 1.4 cm. lato; columna brevi, crassa, basi in pedem 10 mm. longam producta; ovario pedicellato cylindrico, usque ad 1.2 cm. longo.

COLOMBIA: Depto. de Antioquia, Yolombó, ca. 900 m. alt. Coll.: Don Gilberto Escobar no. 308! Type (AMES).

Teuscheria Pickiana (Schltr.) Garay es el pariente más afín a esta nueva especie. Sin embargo su unguiculado y distinto lóbulo medio del labelo, fácilmente lo diferencia de las otras especies. Debe ser mencionado que el Dr. L. O. Williams ha publicado un dibujo en Ceiba, vol 4: 272, 1955 bajo el nombre de *Xylobium Pickianum* (Schltr.) L. O. Wms., basado en el material de Costa Rica. Sin embargo los detalles florales de este dibujo son los de la nueva especie descrita aquí, pues el lóbulo central del labelo es subrotundo y sésil. No he visto aun más material de esta nueva especie fuera del ejemplar tipo.

Teuscheria Pickiana (Schltr.) Garay is the closest related species to this new one. However, the distinctly unguiculate midlobe of its lip easily differentiates it from the other species. It should be mentioned that Dr. L. O. Williams has published a drawing in Ceiba, vol 4: 272, 1955, under *Xylobium Pickianum* (Schltr.) L. O. Wms. based on Costa Rica material. The floral details of this drawing, however, are those of the new species described here, for the midlobe of the lip is subrotund and sessile. I have not yet seen other material of this new species beside the type collection.