

T. Powellii Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, 15—18 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis glabris; pseudobulbis oblongoideis, leviter compressis, unifoliatis, c. 5 cm altis, medio 1,5—1,7 cm latis, juvenilibus basi vaginis arcte amplexantibus sparsim atropurpureo-guttulatis donatis; folio suberecto, anguste lanceolato-oblongo, subacuto, basin versus sensim paulo angustato, c. 11 cm longo, medio fere c. 2,7 cm lato; inflorescentiis singulis, ut videtur vulgo 1—2-floris, pedunculo brevi; bracteis lanceolatis, acutis, ovario pedicellato fere 3-plo brevioribus, floribus in genere inter minores, glabris; sepalis linearibus, acutis, c. 3,7 cm longis, lateralibus obliquis; petalis quam sepala similibus, sed medio paululo dilatatis, c. 3,5 cm longis; labello columnam amplexante explanato e basi late cuneata in quarta parte anteriore trilobo 3,7 cm longo, supra medium 3 cm lato, ima basi callo brevi basi columnae adnato, lobis lateralibus rotundatis, valde obtusis, lobo antico brevi reniformi vel transverse elliptico, apice breviter exciso, c. 1 cm longo, 1,6 cm lato; columna subrecta, 1,7 cm alto, clinandrii lobis cuculliformi conniventibus valde laceratis; ovario pedicellato glabro, 3 cm longo.

Panama: Gewöhnlich auf Mango-Bäumen, in der Umgebung von Panama-City — no. 9.

Die Art, eine der kleinblütigsten in der Sektion *Eutrichopilia* dürfte wohl der *T. Purialbae* Rehb. f. aus Costa Rica am nächsten stehen, hat aber kleinere Blüten und ist durch den sehr kurzen Vorderlappen des Labellums, dessen Ränder fast ganz glatt sind, gekennzeichnet.

Über die Blütenfärbung schreibt Mr. Powell: „Sepals and petals pale whitish yellow, some what twisted; lip white with yellow throat, marked with red stains in lines.“